

GRAPER[®]
(THC 30.0% & CBD ≤1.0%)

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

Το παρόν έντυπο απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα στα οποία έχει συνταγογραφηθεί το φάρμακο.

GR.MED.00014.01 | Ημερομηνία έγκρισης από τον ΕΟΦ: 16/07/2025

Καλωσήρθατε στον οδηγό σας για το GRAPERΑ

Ο Οδηγός αυτός έχει δημιουργηθεί για να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα που μπορεί να έχετε σχετικά με το φάρμακο και τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη χορήγησή του και να επιστήσει την προσοχή σας στον **δυσνητικό κίνδυνο φαρμακευτικού λάθους λόγω χρήσης των ιατροτεχνολογικών συσκευών** που χρησιμοποιούνται για την διά εισπνοής χορήγηση του GRAPERΑ.

Στον Οδηγό αυτό θα βρείτε πληροφορίες για τα παρακάτω:

- Τι είναι το GRAPERΑ και ποια είναι η χρήση του
- Πώς να πάρετε το GRAPERΑ
- Πώς γίνεται η χορήγηση του GRAPERΑ
- Οδηγίες χρήσης ιατροτεχνολογικών συσκευών για τη χορήγηση του GRAPERΑ
 - Σημεία χρήσης συσκευής MIGHTY MEDIC που χρήζουν προσοχής
 - Σημεία χρήσης συσκευής MIGHTY+ MEDIC που χρήζουν προσοχής
 - Σημεία χρήσης συσκευής VOLCANO MEDIC 2 που χρήζουν προσοχής
- Βοηθητική κάρτα καταγραφής τιτλοποίησης της δόσης με χρήση συσκευής MIGHTY MEDIC και MIGHTY+ MEDIC
- Βοηθητική κάρτα καταγραφής τιτλοποίησης της δόσης με χρήση συσκευής VOLCANO MEDIC 2
- Ημερολόγιο δόσεων
- Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το GRAPERΑ παρακαλώ ανατρέξτε στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (ΦΟΧ) του Προϊόντος. Το ΦΟΧ είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ:

<https://services.eof.gr/human-search/home.xhtml>

- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
- Για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης της συσκευής, ανατρέξτε στις εσωκλειστες οδηγίες χρήσης που υπάρχουν στη συσκευή.

Τι είναι το GRAPERΑ και ποια είναι η χρήση του

Το GRAPERΑ είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης προς εισπνοή, που περιέχει τις δραστικές ουσίες Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και Κανναβιδιόλη (CBD). Η THC αποτελεί το βασικό ψυχοδραστικό συστατικό του GRAPERΑ ενώ η CBD είναι η μη ψυχοδραστική ουσία του. Η THC δρα στους υποδοχείς του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος (CB1, CB2), καθώς και σε ορισμένους άλλους υποδοχείς.

Η CBD έχει πολύ χαμηλή συγγένεια δέσμευσης στους υποδοχείς CB1 και CB2, αλλά δρα ως ανταγωνιστής των υποδοχέων αυτών. Πολλαπλοί μηχανισμοί φαίνεται να εμπλέκονται στην φαρμακολογική δράση της CBD καθώς έχουν περιγραφεί αρκετές αλληλεπιδράσεις με υποδοχείς, ένζυμα και πρωτεΐνες μεταφοράς/κανάλια.

Η συνταγογράφηση του GRAPERΑ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί θεραπεία πρώτης επιλογής. Σας δόθηκε επειδή δεν ανταποκριθήκατε σε άλλα θεραπευτικά σχήματα ή παρεμβάσεις ή τα διαθέσιμα για την αντιμετώπιση θεραπευτικά σχήματα δεν έγιναν καλά ανεκτά ή αντενδείκνυνται για εσάς. Αν λαμβάνετε για πρώτη φορά φαρμακευτική κάνναβη, το GRAPERΑ δεν ενδείκνυται για εσάς.

Το GRAPERΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

- Πρόληψη και αντιμετώπιση σοβαρής ναυτίας ή εμέτου από χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και συνδυαστική θεραπεία έναντι HIV ή ηπατίτιδας C.
- Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου, που σχετίζεται με καρκίνο ή παθήσεις του κεντρικού ή περιφερικού νευρικού συστήματος, όπως νευροπαθητικός πόνος που προκαλείται από: νευρική βλάβη, «μέλος φάντασμα», νευραλγία τριδύμου, μεθερπητική νευραλγία.
- Αντιμετώπιση σπαστικότητας που σχετίζεται με σκλήρυνση κατά πλάκας ή βλάβες του νωτιαίου μυελού.
- Ως ορεξιογόνο στην παρηγορική (ανακουφιστική) φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπείες για καρκίνο ή επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS).

Το GRAPERΑ αντενδείκνυται σε παιδιά και εφήβους, σε ασθενείς με ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό ψυχωσικής συνδρομής, καθώς επίσης αντενδείκνυται η χρήση του κατά την κύηση και τη γαλουχία και σε ασθενείς που προγραμματίζουν να τεκνοποιήσουν.

Συνιστάται η λήψη κατάλληλων μέτρων αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για 3 μήνες μετά τη διακοπή της.

Πώς να πάρετε το GRAPERΑ

Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η δοσολογία του GRAPERΑ καθορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με το επιδιωκόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα και τη θεραπευτική ένδειξη.

- Η χορήγηση γίνεται μέσω τιτλοποίησης δόσης με σκοπό τον προσδιορισμό της βέλτιστης δόσης του φαρμάκου η οποία καθορίζεται με ανοδική τιτλοποίηση για κάθε ασθενή.

- Για λόγους ασφαλείας **συνιστάται η χρήση της ελάχιστης αποτελεσματικής δόσης, για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.**
- Η προσέγγιση για την έναρξη της θεραπείας με φαρμακευτική κάνναβη είναι **“ξεκινήστε χαμηλά, πηγαίνετε αργά και παραμείνετε χαμηλά”**. Συνεπώς, η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά με ένα σχήμα χαμηλής δόσης και να ακολουθεί αργή τιτλοποίηση της δόσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τους κινδύνους από τη χρήση του, ανατρέξτε στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης του προϊόντος.

Πώς γίνεται η χορήγηση του GRAPERΑ

Η χορήγηση του GRAPERΑ γίνεται διά εισπνοής με τη βοήθεια των πιστοποιημένων συσκευών **MIGHTY MEDIC, MIGHTY+ MEDIC και VOLCANO MEDIC 2** (κατασκευαστής: *Storz & Bickel GmbH, In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen, Germany*), οι οποίες φέρουν σήμανση **CE** και έχουν κοινοποιηθεί στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Η εξοικείωση σας ή/και των φροντιστών σας με τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής κρίνεται **απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί ο δυνητικός κίνδυνος “φαρμακευτικού λάθους λόγω χρήσης των ιατροτεχνολογικών συσκευών”** όπως για παράδειγμα υποδοσολογία, υπερδοσολογία, λάθη στην τιτλοποίηση της δόσης κ.λ.π.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης των ιατροτεχνολογικών συσκευών είναι διαθέσιμες στα **Παραρτήματα Α, Β, Γ του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης.**

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε αλλαγή από τη μία ατμοποιητική συσκευή στην άλλη απαιτεί προσαρμογή της δόσης λόγω της διαφορετικής απόδοσης των συσκευών και προσεκτική ιατρική παρακολούθηση Σε περίπτωση αλλαγής συσκευής, διαβάστε ξανά τον παρόντα Οδηγό και το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ώστε να εξοικειωθείτε με τη νέα συσκευή και να είστε σίγουροι ότι κατανοείτε πλήρως πώς λειτουργεί.

Οδηγίες χρήσης ιατροτεχνολογικών συσκευών για τη χορήγηση του GRAPERΑ

Σημεία χρήσης συσκευής MIGHTY MEDIC που χρήζουν προσοχής

Μέτρηση δόσης:

Για να χορηγήσετε σωστά τη δόση και να αποφευχθούν φαρμακευτικά λάθη όπως υπερδοσολογία, υποδοσολογία και λάθη στην τιτλοποίηση της δόσης, πρέπει:

- Αφού ζυγίσετε τη δόση τεμαχισμένων ανθέων κάνναβης (*Cannabis sativa* L.) που σας έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας, γεμίστε την σε κάψουλα δοσολογίας με τη βοήθεια του καπακιού του γεμιστήρα (χοάνη)
- Στη συνέχεια, τοποθετήστε το καπάκι της κάψουλας δοσολογίας
- Αφαιρέστε τη μονάδα ψύξης με στροφή 90° προς τα αριστερά
- Τοποθετήστε τη γεμισμένη με τη συνιστώμενη δόση κάψουλα δοσολογίας με το καπάκι προς τα επάνω μέσα στον θάλαμο πλήρωσης του ατμοποιητή και τοποθετήστε ξανά τη μονάδα ψύξης στρέφοντάς την 90° προς τα δεξιά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάθε κάψουλα έχει μέγιστη χωρητικότητα περίπου 0,15g (150mg) ξηρού άνθους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα τεμαχισμένα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης θα πρέπει να ζυγίζονται σε ζυγαριά ακριβείας τριών δεκαδικών ψηφίων. Να μη χρησιμοποιείται ζυγαριά οικιακής χρήσης.

Προθέρμανση:

Για να πραγματοποιηθεί σωστή χορήγηση της δόσης πρέπει η συσκευή να έχει προθερμανθεί και να έχει ρυθμιστεί στην κατάλληλη θερμοκρασία.

- Ο ατμοποιητής προσφέρει δύο προκαθορισμένα επίπεδα θερμοκρασίας: Τη βασική θερμοκρασία των 180°C και την ενισχυμένη θερμοκρασία των 195°C. **Συνιστάται η αρχική εισπνοή να γίνεται σε θερμοκρασία 180°C.**

Εισπνοή:

Επιπρόσθετα, η τεχνική και ο τρόπος εισπνοής είναι μέγιστης σημασίας για να διασφαλιστεί η λήψη της συνταγογραφούμενης από τον θεράποντα ιατρό δόσης.

- Τοποθετήστε το επιστόμιο ανάμεσα στα χείλη και εισπνεύστε για μερικά δευτερόλεπτα ομοιόμορφα και αργά μέχρι το μισό της κανονικής σας ικανότητας αναπνοής.
- Κρατήστε τον αέρα μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εκπνεύστε αργά.
- Όταν οι ατμοί εξασθενίσουν, χρειάζεται να γίνει ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 210°C. Μόλις δεν εμφανίζονται πλέον αναγνωρίσιμοι ατμοί κατά την εκπνοή στους 210°C, η κάψουλα δοσολογίας έχει αναλωθεί και η ατμοποίηση ολοκληρώθηκε.

Για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης και συντήρηση/καθαρισμό της συσκευής, ανατρέξτε στις εσωκλειστες οδηγίες χρήσης που υπάρχουν στη συσκευή MIGHTY+ MEDIC.

Σημεία χρήσης συσκευής MIGHTY+ MEDIC που χρήζουν προσοχής

Τρόπος πλήρωσης:

Ένας παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο για τη σωστή χορήγηση της δόσης και την αποφυγή φαρμακευτικού λάθους είναι ο σωστός τρόπος πλήρωσης. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι πλήρωσης:

Πρώτος τρόπος: Πλήρωση του θαλάμου πλήρωσης:


- Αφαιρέστε τη Μονάδα Ψύξης από τον ατμοποιητή στρίβοντάς την κατά 90° προς τα αριστερά.
- Γεμίστε το θάλαμο πλήρωσης με τα ζυγισμένα και τεμαχισμένα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης.
- Απομακρύνετε τυχόν τεμαχισμένα άνθη κάνναβης από το στόμιο του θαλάμου πλήρωσης.
- Τοποθετήστε τη Μονάδα Ψύξης με στροφή 90° προς τα δεξιά επάνω στον ατμοποιητή.

Δεύτερος Τρόπος: Κάψουλες δοσολογίας (μιας χρήσης) και γεμιστήρας:

Εναλλακτικά μπορεί να γίνει τοποθέτηση στον θάλαμο πλήρωσης καψουλών δοσολογίας που είναι γεμισμένες με τη συνιστώμενη δόση τεμαχισμένων ξηρών ανθέων κάνναβης.

- Τοποθετήστε τα τεμαχισμένα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης (*Cannabis sativa* L.) στην συνιστώμενη δόση αφού έχουν ζυγιστεί, σε κάψουλα δοσολογίας με τη βοήθεια του καπακιού του γεμιστήρα (χοάνη).
- Τοποθετήστε το καπάκι της κάψουλας δοσολογίας.
- Αφαιρέστε τη Μονάδα Ψύξης με στροφή 90° προς τα αριστερά από τον Ατμοποιητή.
- Τοποθετήστε την κάψουλα δοσολογίας - με το καπάκι προς τα επάνω - στον θάλαμο πλήρωσης.
- Τοποθετήστε τη Μονάδα Ψύξης με στροφή 90° προς τα δεξιά επάνω στον Ατμοποιητή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα τεμαχισμένα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης θα πρέπει να ζυγίζονται σε ζυγαριά ακριβείας τριών δεκαδικών ψηφίων. Να μη χρησιμοποιείται ζυγαριά οικιακής χρήσης.



ΚΑΨΟΥΛΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ (ΧΟΑΝΗ) ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ

Προθέρμανση:


Για να πραγματοποιηθεί σωστή χορήγηση της δόσης πρέπει η συσκευή να έχει προθερμανθεί σωστά και να έχει ρυθμιστεί στην κατάλληλη θερμοκρασία.

- Συνιστάται να ξεκινήσετε την εισπνοή στους 180 °C.
- Οι ενδείξεις της πραγματικής και της απαιτούμενης θερμοκρασίας ανάβουν υποδεικνύοντας την έναρξη της διαδικασίας προθέρμανσης. Αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και δύο λεπτά. Η επίτευξη της βασικής θερμοκρασίας επισημαίνεται με διπλή δόνηση.

Εφαρμογή και εισπνοή:

Επιπρόσθετα, η τεχνική και ο τρόπος εισπνοής είναι μέγιστης σημασίας για να διασφαλιστεί η λήψη της συνταγογραφούμενης από τον θεράποντα ιατρό δόσης.

- Τραβήξτε το επιστόμιο προς τα έξω και τοποθετήστε το ανάμεσα στα χείλη σας.
- Εισπνεύστε για μερικά δευτερόλεπτα ομοιόμορφα, εισπνέοντας μόνο έως το ήμισυ της δυνατότητας εισπνοής σας.
- Κρατήστε τον αέρα για μερικά δευτερόλεπτα και εκπνεύστε αργά. Συνιστάται να συγκεντρωθείτε στη διαδικασία εισπνοής.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗ MIGHTY+ MEDIC

Για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης και συντήρηση/καθαρισμό της συσκευής, ανατρέξτε στις εσωκλειστές οδηγίες χρήσης που υπάρχουν στη συσκευή MIGHTY+ MEDIC.

Σημεία χρήσης συσκευής VOLCANO MEDIC 2 που χρήζουν προσοχής

Συνιστάται **ιδιαίτερη προσοχή** στις παρακάτω λειτουργίες της συσκευής προκειμένου να αποφευχθεί ο δυνητικός κίνδυνος φαρμακευτικού λάθους λόγω χρήσης της συσκευής:

Προθέρμανση:

Για να χορηγηθεί η δόση σωστά, πρέπει η συσκευή να έχει προθερμανθεί και να έχει ρυθμιστεί στην κατάλληλη θερμοκρασία.

- Η διαδικασία προθέρμανσης έχει ολοκληρωθεί, όταν η απαιτούμενη και η πραγματική τιμή συμπίπτουν.
- Συνιστάται ατμοποίηση μικρών ποσοτήτων (50 – 150mg) στο θάλαμο πλήρωσης σε μέγιστη θερμοκρασία 210°C.

Μέτρηση δόσης:

Για να χορηγηθεί η δόση σωστά και να αποφευχθούν φαρμακευτικά λάθη όπως υπερδοσολογία, υποδοσολογία και λάθη στην τιτλοποίηση της δόσης, πρέπει:

- Αφού ζυγίσετε τη δόση τεμαχισμένων ξηρών ανθέων φυτού κάνναβης (*Cannabis sativa* L.) που σας έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας, να γεμίσετε τις κάψουλες δοσολογίας που διατίθενται ως ανταλλακτικά εξαρτήματα, με την ποσότητα τεμαχισμένων ανθέων. Η κάθε κάψουλα έχει μέγιστη χωρητικότητα περίπου 0,15g (150mg) ξηρού ανθού. Η κάψουλα από μόνη της έχει βάρος 0,35g.

Τρόπος πλήρωσης:

Ένας ακόμα παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο προκειμένου να λάβετε σωστά τη δόση και να αποφευχθεί τυχόν φαρμακευτικό λάθος είναι ο σωστός τρόπος πλήρωσης. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι πλήρωσης:

Πρώτος Τρόπος: Προετοιμασία και πλήρωση του θαλάμου πλήρωσης:

Ο θάλαμος πλήρωσης πρέπει να γεμιστεί σωστά με τα ζυγισμένα στη συνιστώμενη δόση τεμαχισμένα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης.

- Πρέπει το περιεχόμενο του θαλάμου πλήρωσης να χρησιμοποιείται για το γέμισμα ενός μόνο μπαλονιού-βαλβίδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα τεμαχισμένα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης θα πρέπει να ζυγίζονται σε ζυγαριά ακριβείας τριών δεκαδικών ψηφίων. Να μη χρησιμοποιείται ζυγαριά οικιακής χρήσης.



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ

Δεύτερος τρόπος πλήρωσης:

Κάψουλες δοσολογίας (μιας χρήσης) και γεμιστήρας:

Εναλλακτικά:

- Μπορείτε να γεμίσετε τις κάψουλες δοσολογίας, που διατίθενται ως ανταλλακτικά εξαρτήματα, με τα τεμαχισμένα και ζυγισμένα στη συνιστώμενη από τον γιατρό σας δόση ξηρά άνθη φυτού κάνναβης και να τις φυλάξετε στον γεμιστήρα μέχρι τη χρήση τους. Αυτό διευκολύνει τον χειρισμό.

- Στη συνέχεια τοποθετήστε την κάψουλα δοσολογίας - με το καπάκι προς τα επάνω - στον προσαρμογέα κάψουλας δοσολογίας και βιδώστε το καπάκι του θαλάμου πλήρωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κάψουλες δοσολογίας είναι αναλώσιμα, που πρέπει να απορριφθούν στα οικιακά απορρίμματα μετά τη χρήση τους.



ΚΑΨΟΥΛΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ


Εισπνοή:

Επιπρόσθετα, η τεχνική και ο τρόπος εισπνοής είναι μέγιστης σημασίας για να διασφαλιστεί η λήψη της συνταγογραφούμενης από τον θεράποντα ιατρό δόσης.

Υπάρχουν δύο τρόποι εισπνοής από τη συσκευή Volcano Medic 2:

Πρώτος Τρόπος: Εισπνοή από μπαλόνι-βαλβίδα:


- Για να εισπνεύσετε τοποθετήστε το επιστόμιο ανάμεσα στα χείλη. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει η βαλβίδα και μπορεί να εισπνευστεί το αερόλυμα μέσα από το μπαλόνι-βαλβίδα.
- Για να αποφευχθεί η συγκέντρωση υγρασίας στο μπαλόνι-βαλβίδα και να μειωθεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης, να μην εκπνέετε μέσα στο μπαλόνι-βαλβίδα.
- Το μπαλόνι-βαλβίδα δεν είναι κατάλληλο να διατηρήσει το αερόλυμα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 λεπτών, διότι αυτό υγροποιείται με το πέρασμα του χρόνου.



ΕΙΣΠΝΟΗ ΑΠΟ ΜΠΑΛΟΝΙ-ΒΑΛΒΙΔΑ

Δεύτερος Τρόπος: Εισπνοή από μονάδα εύκαμπτου σωλήνα:

Είναι σημαντικό να εισπνέετε αργά τον ατμό για μερικά δευτερόλεπτα από τον εύκαμπτο σωλήνα αφού τοποθετήσετε το επιστόμιο. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφευχθεί η συγκέντρωση υγρασίας στον εύκαμπτο σωλήνα και να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης, **δεν πρέπει να εκπνέετε μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα.**



ΕΙΣΠΝΟΗ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

Εισπνεύστε κατά το ήμισυ της κανονικής ικανότητας αναπνοής σας. **Και για τους δύο τρόπους εισπνοής καλείστε να κρατήσετε τον αέρα μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να εκπνεύσετε αργά.**

Για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης και συντήρηση/καθαρισμό της συσκευής, ανατρέξτε στις εσώκλειστες οδηγίες χρήσης που υπάρχουν στη συσκευή VOLCANO MEDIC 2.

Βοηθητική κάρτα καταγραφής τιτλοποίησης της δόσης με χρήση συσκευής **MIGHTY MEDIC** και **MIGHTY+ MEDIC**

Η καθημερινή συμπλήρωση της κάρτας καταγραφής τιτλοποίησης της δόσης είναι μέγιστης σημασίας **προκειμένου να αποφύγετε τυχόν φαρμακευτικά λάθη όπως λάθη στην τιτλοποίηση της δόσης, υπερδοσολογία, υποδοσολογία, ή παράλειψη της δόσης**. Η κάρτα αυτή θα σας βοηθήσει να καταγράψετε τη δόση που λαμβάνετε καθημερινά και να προγραμματίζετε τα επόμενα βήματά σας για την ορθή λήψη του φαρμάκου.

Η τιτλοποίηση της δόσης πραγματοποιείται ανά 3 ημέρες και κάθε τριήμερο διακρίνεται στην κάρτα από τη μεγάλου πάχους διαχωριστική γραμμή.

Η συνολική ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ημερήσια δόση που αναγράφεται στη δεξιά στήλη.

Όταν φτάσετε σε μια δόση που είναι καλά ανεκτή και η ανταπόκριση είναι επαρκής, θα παραμείνετε σε αυτή με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού σας και δεν θα προχωρήσετε με τη συμπλήρωση των υπολοίπων γραμμών του πίνακα τιτλοποίησης.

Ημέρα Τιτλοποίησης & Ημερομηνία	Εάν το GRAPERA χορηγείται ως ορεξιγόνο, το δοσολογικό σχήμα των ημερών 1-3 παραλείπεται και ξεκινάτε απευθείας με το σχήμα των ημερών 4-6. Στον χρόνιο πόνο και τη σπαστικότητα, η ανοδική τιτλοποίηση ξεκινάει ως εξής:		Συνολική ημερήσια δόση που ελήφθη	Μέγιστη ημερήσια δόση
Ημέρα 1: /...../.....	☐ 2 εισπνοές από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)	Σημείωση: Τοποθετήστε 0,05g (50 mg) προϊόντος στη συσκευή και πραγματοποιήστε δύο εισπνοές με διαφορά 10 λεπτών.	-	2 εισπνοές από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)
Ημέρα 2: /...../.....	☐ 2 εισπνοές από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)		-	2 εισπνοές από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)
Ημέρα 3: /...../.....	☐ 2 εισπνοές από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)		-	2 εισπνοές από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)
Ημέρα Τιτλοποίησης & Ημερομηνία	Εάν το GRAPERA χορηγείται ως ορεξιγόνο ή εάν το δοσολογικό σχήμα των Ημερών 1-3 είναι καλά ανεκτό αλλά η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής, το δοσολογικό σχήμα διαμορφώνεται ως εξής:		Συνολική ημερήσια δόση που ελήφθη	Μέγιστη ημερήσια δόση
Ημέρα 4: /...../.....	☐ 0,05g (50mg)	Σημείωση: Τοποθετήστε 0,05g (50 mg) προϊόντος στη συσκευή και εισπνεύστε όλο το αερόλυμα μέσα σε 10 λεπτά.	-	0,05g (50mg)
Ημέρα 5: /...../.....	☐ 0,05g (50mg)		-	0,05g (50mg)
Ημέρα 6: /...../.....	☐ 0,05g (50mg)		-	0,05g (50mg)
Ημέρα Τιτλοποίησης & Ημερομηνία	Εάν το δοσολογικό σχήμα των Ημερών 4-6 είναι καλά ανεκτό αλλά η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής, το δοσολογικό σχήμα διαμορφώνεται ως εξής:		Συνολική ημερήσια δόση που ελήφθη	Μέγιστη ημερήσια δόση
Ημέρα 7: /...../.....	☐ 0,065g (65mg)	Σημείωση: Τοποθετήστε 0,065g (65 mg) προϊόντος στη συσκευή και εισπνεύστε	-	0,065g (65mg)
Ημέρα 8: /...../.....	☐ 0,065g (65mg)		-	0,065g (65mg)

Ημέρα 9:/...../.....	☐ 0,065g (65mg)	όλο το αερόλυμα μέσα σε 10 λεπτά.	-		0,065g (65mg)
Ημέρα Τιτλοποίησης & Ημερομηνία	Η ανοδική τιτλοποίηση μπορεί να συνεχιστεί προσθέτοντας 0,015g (15mg) στο προηγούμενο σχήμα κάθε 3 ημέρες, εάν δεν έχει επιτευχθεί το επιθυμητό κλινικό αποτέλεσμα και εφόσον το σχήμα είναι καλά ανεκτό. Σημείωση: Η ημερήσια δόση μπορεί να διαιρεθεί σε επιμέρους χορηγήσεις. Κάθε χορήγηση ξηρών ανθέων κάνναβης δεν είναι μικρότερη των 0,05g (50 mg) και μεγαλύτερη των 0,15g (150 mg). Σε κάθε χορήγηση, ολοκληρώστε την εισπνοή του αερολύματος μέσα σε 10 λεπτά. Μετά από κάθε χορήγηση, περιμένετε 15 λεπτά.		Προσθήκη 0,015g (15mg) στο προηγούμενο δοσολογικό σχήμα	Συνολική ημερήσια δόση που ελήφθη	Μέγιστη ημερήσια δόση
Ημέρα 10:/...../.....	☐ 0,065g (65mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,080g (80mg)
Ημέρα 11:/...../.....	☐ 0,065g (65mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,080g (80mg)
Ημέρα 12:/...../.....	☐ 0,065g (65mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,080g (80mg)
Ημέρα 13:/...../.....	☐ 0,080g (80mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,095g (95mg)
Ημέρα 14:/...../.....	☐ 0,080g (80mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,095g (95mg)
Ημέρα 15:/...../.....	☐ 0,080g (80mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,095g (95mg)
Ημέρα 16:/...../.....	☐ 0,095g (95mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,11g (110mg)
Ημέρα 17:/...../.....	☐ 0,095g (95mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,11g (110mg)
Ημέρα 18:/...../.....	☐ 0,095g (95mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,11g (110mg)
Ημέρα 19:/...../.....	☐ 0,11g (110mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,125g (125mg)
Ημέρα 20:/...../.....	☐ 0,11g (110mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,125g (125mg)
Ημέρα 21:/...../.....	☐ 0,11g (110mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,125g (125mg)
Ημέρα 22:/...../.....	☐ 0,125g (125mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,14g (140mg)
Ημέρα 23:/...../.....	☐ 0,125g (125mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,14g (140mg)
Ημέρα 24:/...../.....	☐ 0,125g (125mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,14g (140mg))
Ημέρα 25:/...../.....	☐ 0,14g (140mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,155g (155mg)
Ημέρα 26:/...../.....	☐ 0,14g (140mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,155g (155mg)
Ημέρα 27:/...../.....	☐ 0,14g (140mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,155g (155mg)
Ημέρα 28:/...../.....	☐ 0,155g (155mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,17g (170mg)
Ημέρα 29:/...../.....	☐ 0,155g (155mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,17g (170mg)
Ημέρα 30:/...../.....	☐ 0,155g (155mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,17g (170mg)
Ημέρα 31:/...../.....	☐ 0,17g (170mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,185g (185mg)
Ημέρα 32:/...../.....	☐ 0,17g (170mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,185g (185mg)
Ημέρα 33:/...../.....	☐ 0,17g (170mg))		☐ 0,015g (15mg)		0,185g (185mg)
Ημέρα 34:/...../.....	☐ 0,185g (185mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,2g (200mg)
Ημέρα 35:/...../.....	☐ 0,185g (185mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,2g (200mg)
Ημέρα 36:/...../.....	☐ 0,185g (185mg)		☐ 0,015g (15mg)		0,2g (200mg)

Ημέρα 37:/...../.....	☐ 0,2g (200mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,215g (215mg)
Ημέρα 38:/...../.....	☐ 0,2g (200mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,215g (215mg)
Ημέρα 39:/...../.....	☐ 0,2g (200mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,215g (215mg)
Ημέρα 40:/...../.....	☐ 0,215g (215mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,23g (230mg)
Ημέρα 41:/...../.....	☐ 0,215g (215mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,23g (230mg)
Ημέρα 42:/...../.....	☐ 0,215g (215mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,23g (230mg)
Ημέρα 43:/...../.....	☐ 0,23g (230mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,245g (245mg)
Ημέρα 44:/...../.....	☐ 0,23g (230mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,245g (245mg)
Ημέρα 45:/...../.....	☐ 0,23g (230mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,245g (245mg)
Ημέρα 46:/...../.....	☐ 0,245g (245mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,26g (260mg)
Ημέρα 47:/...../.....	☐ 0,245g (245mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,26g (260mg)
Ημέρα 48:/...../.....	☐ 0,245g (245mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,26g (260mg)
Ημέρα 49:/...../.....	☐ 0,26g (260mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,275g (275mg)
Ημέρα 50:/...../.....	☐ 0,26g (260mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,275g (275mg)
Ημέρα 51:/...../.....	☐ 0,26g (260mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,275g (275mg)
Ημέρα 52:/...../.....	☐ 0,275g (275mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,29g (290mg)
Ημέρα 53:/...../.....	☐ 0,275g (275mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,29g (290mg)
Ημέρα 54:/...../.....	☐ 0,275g (275mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,29g (290mg)
Ημέρα 55:/...../.....	☐ 0,29g (290mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,305g (305mg)
Ημέρα 56:/...../.....	☐ 0,29g (290mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,305g (305mg)
Ημέρα 57:/...../.....	☐ 0,29g (290mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,305g (305mg)
Ημέρα 58:/...../.....	☐ 0,305g (305mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,32g (320mg)
Ημέρα 59:/...../.....	☐ 0,305g (305mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,32g (320mg)
Ημέρα 60:/...../.....	☐ 0,305g (305mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,32g (320mg)
Ημέρα 61:/...../.....	☐ 0,32g (320mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,335g (335mg)
Ημέρα 62:/...../.....	☐ 0,32g (320mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,335g (335mg)
Ημέρα 63:/...../.....	☐ 0,32g (320mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,335g (335mg)
Ημέρα 64:/...../.....	☐ 0,335g (335mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,35g (350mg)
Ημέρα 65:/...../.....	☐ 0,335g (335mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,35g (350mg)
Ημέρα 66:/...../.....	☐ 0,335g (335mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,35g (350mg)
Ημέρα 67:/...../.....	☐ 0,35g (350mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,365g (365mg)
Ημέρα 68:/...../.....	☐ 0,35g (350mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,365g (365mg)
Ημέρα 69:/...../.....	☐ 0,35g (350mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,365g (365mg)
Ημέρα 70:/...../.....	☐ 0,365g (365mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,38g (380mg)
Ημέρα 71:/...../.....	☐ 0,365g (365mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,38g (380mg)
Ημέρα 72:/...../.....	☐ 0,365g (365mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,38g (380mg)

Ημέρα 73:/...../.....	☐ 0,38g (380mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,395g (395mg)
Ημέρα 74:/...../.....	☐ 0,38g (380mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,395g (395mg)
Ημέρα 75:/...../.....	☐ 0,38g (380mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,395g (395mg)
Ημέρα 76:/...../.....	☐ 0,395g (395mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,41g (410mg)
Ημέρα 77:/...../.....	☐ 0,395g (395mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,41g (410mg)
Ημέρα 78:/...../.....	☐ 0,395g (395mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,41g (410mg)
Ημέρα 79:/...../.....	☐ 0,41g (410mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,425g (425mg)
Ημέρα 80:/...../.....	☐ 0,41g (410mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,425g (425mg)
Ημέρα 81:/...../.....	☐ 0,41g (410mg))	☐ 0,015g (15mg)		0,425g (425mg)
Ημέρα 82:/...../.....	☐ 0,425g (425mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,44g (440mg)
Ημέρα 83:/...../.....	☐ 0,425g (425mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,44g (440mg)
Ημέρα 84:/...../.....	☐ 0,425g (425mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,44g (440mg))
Ημέρα 85:/...../.....	☐ 0,44g (440mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,455g (455mg)
Ημέρα 86:/...../.....	☐ 0,44g (440mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,455g (455mg)
Ημέρα 87:/...../.....	☐ 0,44g (440mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,455g (455mg)
Ημέρα 88:/...../.....	☐ 0,455g (455mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,47g (470mg)
Ημέρα 89:/...../.....	☐ 0,455g (455mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,47g (470mg)
Ημέρα 90:/...../.....	☐ 0,455g (455mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,47g (470mg)
Ημέρα 91:/...../.....	☐ 0,47g (470mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,485g (485mg)
Ημέρα 92:/...../.....	☐ 0,47g (470mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,485g (485mg)
Ημέρα 93:/...../.....	☐ 0,47g (470mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,485g (485mg)
Ημέρα 94:/...../.....	☐ 0,485g (485mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,5g (500mg)
Ημέρα 95:/...../.....	☐ 0,485g (485mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,5g (500mg)
Ημέρα 96:/...../.....	☐ 0,485g (485mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,5g (500mg)
Ημέρα 97:/...../.....	☐ 0,5g (500mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,515g (515mg)
Ημέρα 98:/...../.....	☐ 0,5g (500mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,515g (515mg)
Ημέρα 99:/...../.....	☐ 0,5g (500mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,515g (515mg)
Ημέρα 100:/...../.....	☐ 0,515g (515mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,53g (530mg)
Ημέρα 101:/...../.....	☐ 0,515g (515mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,53g (530mg)
Ημέρα 102:/...../.....	☐ 0,515g (515mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,53g (530mg)
Ημέρα 103:/...../.....	☐ 0,53g (530mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,545g (545mg)
Ημέρα 104:/...../.....	☐ 0,53g (530mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,545g (545mg)
Ημέρα 105:/...../.....	☐ 0,53g (530mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,545g (545mg)
Ημέρα 106:/...../.....	☐ 0,545g (545mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,56g (560mg)
Ημέρα 107:/...../.....	☐ 0,545g (545mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,56g (560mg)
Ημέρα 108:/...../.....	☐ 0,545g (545mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,56g (560mg)

Ημέρα 109:/...../.....	☐ 0,56g (560mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,575g (575mg)
Ημέρα 110:/...../.....	☐ 0,56g (560mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,575g (575mg)
Ημέρα 111:/...../.....	☐ 0,56g (560mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,575g (575mg)
Ημέρα 112:/...../.....	☐ 0,575g (575mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,59g (590mg)
Ημέρα 113:/...../.....	☐ 0,575g (575mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,59g (590mg)
Ημέρα 114:/...../.....	☐ 0,575g (575mg)	☐ 0,015g (15mg)		0,59g (590mg)

Βοηθητική κάρτα καταγραφής τιτλοποίησης της δόσης με χρήση συσκευής **VOLCANO MEDIC 2**

Η καθημερινή συμπλήρωση της κάρτας καταγραφής τιτλοποίησης της δόσης είναι μέγιστης σημασίας **προκειμένου να αποφύγετε τυχόν φαρμακευτικά λάθη όπως λάθη στην τιτλοποίηση της δόσης, υπερδοσολογία, υποδοσολογία, ή παράλειψη της δόσης**. Η κάρτα αυτή θα σας βοηθήσει να καταγράφετε τη δόση που λαμβάνετε καθημερινά και να προγραμματίζετε τα επόμενα βήματά σας για την ορθή λήψη του φαρμάκου.

Η τιτλοποίηση της δόσης πραγματοποιείται ανά 3 ημέρες και κάθε τριήμερο διακρίνεται στην κάρτα από τη μεγάλου πάχους διαχωριστική γραμμή. **Η συνολική ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ημερήσια δόση που αναγράφεται στη δεξιά στήλη.**

Όταν φτάσετε σε μια δόση που είναι καλά ανεκτή και η ανταπόκριση είναι επαρκής, θα παραμείνετε σε αυτή με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού σας και δεν θα προχωρήσετε με τη συμπλήρωση των υπολοίπων γραμμών του πίνακα τιτλοποίησης.

Ημέρα Τιτλοποίησης & Ημερομηνία	Εάν το GRAPERΑ χορηγείται ως ορεξιογόνο, το σχήμα των ημερών 1-3 παραλείπεται και ξεκινάτε απευθείας με το σχήμα των ημερών 4-6. Στον χρόνιο πόνο και τη σπαστικότητα, η ανοδική τιτλοποίηση ξεκινάει ως εξής:		-	Συνολική ημερήσια δόση που ελήφθη	Μέγιστη ημερήσια δόση
Ημέρα 1: /...../.....	☐ 1 εισπνοή από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)	Σημείωση: Τοποθετήστε 0,05g (50 mg) προϊόντος στη συσκευή και πραγματοποιήστε μία εισπνοή	-		1 εισπνοή από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)
Ημέρα 2: /...../.....	☐ 1 εισπνοή από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)		-		1 εισπνοή από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)
Ημέρα 3: /...../.....	☐ 1 εισπνοή από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)		-		1 εισπνοή από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)
Ημέρα Τιτλοποίησης & Ημερομηνία	Εάν το GRAPERΑ χορηγείται ως ορεξιογόνο ή εάν το δοσολογικό σχήμα των Ημερών 1-3 είναι καλά ανεκτό αλλά η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής, το θεραπευτικό σχήμα διαμορφώνεται ως εξής:		-	Συνολική ημερήσια δόση που ελήφθη	Μέγιστη ημερήσια δόση
Ημέρα 4: /...../.....	☐ 2 εισπνοές από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)	Σημείωση: Τοποθετήστε 0,05g (50 mg) προϊόντος στη συσκευή και πραγματοποιήστε δύο εισπνοές με διαφορά 10 λεπτών	-		2 εισπνοές από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)
Ημέρα 5: /...../.....	☐ 2 εισπνοές από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)		-		2 εισπνοές από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)
Ημέρα 6: /...../.....	☐ 2 εισπνοές από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)		-		2 εισπνοές από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)
Ημέρα Τιτλοποίησης & Ημερομηνία	Εάν το δοσολογικό σχήμα των Ημερών 4-6 είναι καλά ανεκτό αλλά η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής, το θεραπευτικό σχήμα διαμορφώνεται ως εξής:			Συνολική ημερήσια δόση που ελήφθη	Μέγιστη ημερήσια δόση

Ημέρα 7: /...../.....	☐ 3 εισπνοές από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)	Σημείωση: Τοποθετήστε 0,05g (50 mg) προϊόντος στη συσκευή και πραγματοποιήστε 3 εισπνοές μέσα σε 10 λεπτά			3 εισπνοές από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)
Ημέρα 8: /...../.....	☐ 3 εισπνοές από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)				3 εισπνοές από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)
Ημέρα 9: /...../.....	☐ 3 εισπνοές από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)				3 εισπνοές από αερόλυμα ποσότητας 0,05g (50mg)
Ημέρα Τιτλοποίησης & Ημερομηνία	Εάν το δοσολογικό σχήμα των Ημερών 7-9 είναι καλά ανεκτό αλλά η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής, το θεραπευτικό σχήμα διαμορφώνεται ως εξής:			Συνολική ημερήσια δόση που ελήφθη	Μέγιστη ημερήσια δόση
Ημέρα 10: /...../.....	☐ 0,05g (50mg)	Σημείωση: Τοποθετήστε 0,05g (50 mg) προϊόντος στη συσκευή και εισπνεύστε όλο το αερόλυμα μέσα σε 10 λεπτά			0,05g (50mg)
Ημέρα 11: /...../.....	☐ 0,05g (50mg)				0,05g (50mg)
Ημέρα 12: /...../.....	☐ 0,05g (50mg)				0,05g (50mg)
Ημέρα Τιτλοποίησης & Ημερομηνία	Η ανοδική τιτλοποίηση μπορεί να συνεχιστεί προσθέτοντας 0,01g (10mg) στο προηγούμενο σχήμα κάθε 3 ημέρες, εάν δεν έχει επιτευχθεί το επιθυμητό κλινικό αποτέλεσμα και εφόσον το σχήμα είναι καλά ανεκτό. Σημείωση: Η ημερήσια δόση μπορεί να διαφευγεί σε επιμέρους χορηγήσεις. Κάθε χορήγηση ξηρών ανθέων κάνναβης δεν είναι μικρότερη των 0,05g (50 mg) και μεγαλύτερη των 0,15g (150 mg). Σε κάθε χορήγηση, ολοκληρώστε την εισπνοή του αερολύματος μέσα σε 10 λεπτά. Μετά από κάθε χορήγηση, περιμένετε 15 λεπτά		Προσθήκη 0,01g (10mg) στο προηγούμενο δοσολογικό σχήμα	Συνολική ημερήσια δόση που ελήφθη	Μέγιστη ημερήσια δόση
Ημέρα 13: /...../.....	☐ 0,05g (50mg)		☐ 0,01g (10mg)		0,06g (60mg)
Ημέρα 14: /...../.....	☐ 0,05g (50mg)		☐ 0,01g (10mg)		0,06g (60mg)
Ημέρα 15: /...../.....	☐ 0,05g (50mg)		☐ 0,01g (10mg)		0,06g (60mg)
Ημέρα 16: /...../.....	☐ 0,06g (60mg)		☐ 0,01g (10mg)		0,07g (70mg)
Ημέρα 17: /...../.....	☐ 0,06g (60mg)		☐ 0,01g (10mg)		0,07g (70mg)
Ημέρα 18: /...../.....	☐ 0,06g (60mg)		☐ 0,01g (10mg)		0,07g (70mg)
Ημέρα 19: /...../.....	☐ 0,07g (70mg)		☐ 0,01g (10mg)		0,08g (80mg)
Ημέρα 20: /...../.....	☐ 0,07g (70mg)		☐ 0,01g (10mg)		0,08g (80mg)
Ημέρα 21: /...../.....	☐ 0,07g (70mg)		☐ 0,01g (10mg)		0,08g (80mg)
Ημέρα 22: /...../.....	☐ 0,08g (80mg)		☐ 0,01g (10mg)		0,09g (90mg)
Ημέρα 23: /...../.....	☐ 0,08g (80mg)		☐ 0,01g (10mg)		0,09g (90mg)
Ημέρα 24: /...../.....	☐ 0,08g (80mg)		☐ 0,01g (10mg)		0,09g (90mg)
Ημέρα 25: /...../.....	☐ 0,09g (90mg)		☐ 0,01g (10mg)		0,1g (100mg)
Ημέρα 26: /...../.....	☐ 0,09g (90mg)		☐ 0,01g (10mg)		0,1g (100mg)
Ημέρα 27: /...../.....	☐ 0,09g (90mg)		☐ 0,01g (10mg)		0,1g (100mg)

Ημέρα 28:/...../.....	☐ 0,1g (100mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,11g (110mg)
Ημέρα 29:/...../.....	☐ 0,1g (100mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,11g (110mg)
Ημέρα 30:/...../.....	☐ 0,1g (100mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,11g (110mg)
Ημέρα 31:/...../.....	☐ 0,11g (110mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,12g (120mg)
Ημέρα 32:/...../.....	☐ 0,11g (110mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,12g (120mg)
Ημέρα 33:/...../.....	☐ 0,11g (110mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,12g (120mg)
Ημέρα 34:/...../.....	☐ 0,12g (120mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,13g (130mg)
Ημέρα 35:/...../.....	☐ 0,12g (120mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,13g (130mg)
Ημέρα 36:/...../.....	☐ 0,12g (120mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,13g (130mg)
Ημέρα 37:/...../.....	☐ 0,13g (130mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,14g (140mg)
Ημέρα 38:/...../.....	☐ 0,13g (130mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,14g (140mg)
Ημέρα 39:/...../.....	☐ 0,13g (130mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,14g (140mg)
Ημέρα 40:/...../.....	☐ 0,14g (140mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,15g (150mg)
Ημέρα 41:/...../.....	☐ 0,14g (140mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,15g (150mg)
Ημέρα 42:/...../.....	☐ 0,14g (140mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,15g (150mg)
Ημέρα 43:/...../.....	☐ 0,15g (150mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,16g (160mg)
Ημέρα 44:/...../.....	☐ 0,15g (150mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,16g (160mg)
Ημέρα 45:/...../.....	☐ 0,15g (150mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,16g (160mg)
Ημέρα 46:/...../.....	☐ 0,16g (160mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,17g (170mg)
Ημέρα 47:/...../.....	☐ 0,16g (160mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,17g (170mg)
Ημέρα 48:/...../.....	☐ 0,16g (160mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,17g (170mg)
Ημέρα 49:/...../.....	☐ 0,17g (170mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,18g (180mg)
Ημέρα 50:/...../.....	☐ 0,17g (170mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,18g (180mg)
Ημέρα 51:/...../.....	☐ 0,17g (170mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,18g (180mg)
Ημέρα 52:/...../.....	☐ 0,18g (180mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,19g (190mg)
Ημέρα 53:/...../.....	☐ 0,18g (180mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,19g (190mg)
Ημέρα 54:/...../.....	☐ 0,18g (180mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,19g (190mg)
Ημέρα 55:/...../.....	☐ 0,19g (190mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,2g (200mg)
Ημέρα 56:/...../.....	☐ 0,19g (190mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,2g (200mg)
Ημέρα 57:/...../.....	☐ 0,19g (190mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,2g (200mg)
Ημέρα 58:/...../.....	☐ 0,2g (200mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,21g (210mg)
Ημέρα 59:/...../.....	☐ 0,2g (200mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,21g (210mg)
Ημέρα 60:/...../.....	☐ 0,2g (200mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,21g (210mg)
Ημέρα 61:/...../.....	☐ 0,21g (210mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,22g (220mg)
Ημέρα 62:/...../.....	☐ 0,21g (210mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,22g (220mg)
Ημέρα 63:/...../.....	☐ 0,21g (210mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,22g (220mg)

Ημέρα 64:/...../.....	☐ 0,22g (220mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,23g (230mg)
Ημέρα 65:/...../.....	☐ 0,22g (220mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,23g (230mg)
Ημέρα 66:/...../.....	☐ 0,22g (220mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,23g (230mg)
Ημέρα 67:/...../.....	☐ 0,23g (230mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,24g (240mg)
Ημέρα 68:/...../.....	☐ 0,23g (230mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,24g (240mg)
Ημέρα 69:/...../.....	☐ 0,23g (230mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,24g (240mg)
Ημέρα 70:/...../.....	☐ 0,24g (240mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,25g (250mg)
Ημέρα 71:/...../.....	☐ 0,24g (240mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,25g (250mg)
Ημέρα 72:/...../.....	☐ 0,24g (240mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,25g (250mg)
Ημέρα 73:/...../.....	☐ 0,25g (250mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,26g (260mg)
Ημέρα 74:/...../.....	☐ 0,25g (250mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,26g (260mg)
Ημέρα 75:/...../.....	☐ 0,25g (250mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,26g (260mg)
Ημέρα 76:/...../.....	☐ 0,26g (260mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,27g (270mg)
Ημέρα 77:/...../.....	☐ 0,26g (260mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,27g (270mg)
Ημέρα 78:/...../.....	☐ 0,26g (260mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,27g (270mg)
Ημέρα 79:/...../.....	☐ 0,27g (270mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,28g (280mg)
Ημέρα 80:/...../.....	☐ 0,27g (270mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,28g (280mg)
Ημέρα 81:/...../.....	☐ 0,27g (270mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,28g (280mg)
Ημέρα 82:/...../.....	☐ 0,28g (280mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,29g (290mg)
Ημέρα 83:/...../.....	☐ 0,28g (280mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,29g (290mg)
Ημέρα 84:/...../.....	☐ 0,28g (280mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,29g (290mg)
Ημέρα 85:/...../.....	☐ 0,29g (290mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,3g (300mg)
Ημέρα 86:/...../.....	☐ 0,29g (290mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,3g (300mg)
Ημέρα 87:/...../.....	☐ 0,29g (290mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,3g (300mg)
Ημέρα 88:/...../.....	☐ 0,3g (300mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,31g (310mg)
Ημέρα 89:/...../.....	☐ 0,3g (300mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,31g (310mg)
Ημέρα 90:/...../.....	☐ 0,3g (300mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,31g (310mg)
Ημέρα 91:/...../.....	☐ 0,31g (310mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,32g (320mg)
Ημέρα 92:/...../.....	☐ 0,31g (310mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,32g (320mg)
Ημέρα 93:/...../.....	☐ 0,31g (310mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,32g (320mg)
Ημέρα 94:/...../.....	☐ 0,32g (320mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,33g (330mg)
Ημέρα 95:/...../.....	☐ 0,32g (320mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,33g (330mg)
Ημέρα 96:/...../.....	☐ 0,32g (320mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,33g (330mg)
Ημέρα 97:/...../.....	☐ 0,33g (330mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,34g (340mg)
Ημέρα 98:/...../.....	☐ 0,33g (330mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,34g (340mg)
Ημέρα 99:/...../.....	☐ 0,33g (330mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,34g (340mg)

Ημέρα 100:/...../.....	☐ 0,34g (340mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,35g (350mg)
Ημέρα 101:/...../.....	☐ 0,34g (340mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,35g (350mg)
Ημέρα 102:/...../.....	☐ 0,34g (340mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,35g (350mg)
Ημέρα 103:/...../.....	☐ 0,35g (350mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,36g (360mg)
Ημέρα 104:/...../.....	☐ 0,35g (350mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,36g (360mg)
Ημέρα 105:/...../.....	☐ 0,35g (350mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,36g (360mg)
Ημέρα 106:/...../.....	☐ 0,36g (360mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,37g (370mg)
Ημέρα 107:/...../.....	☐ 0,36g (360mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,37g (370mg)
Ημέρα 108:/...../.....	☐ 0,36g (360mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,37g (370mg)
Ημέρα 109:/...../.....	☐ 0,37g (370mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,38g (380mg)
Ημέρα 110:/...../.....	☐ 0,37g (370mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,38g (380mg)
Ημέρα 111:/...../.....	☐ 0,37g (370mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,38g (380mg)
Ημέρα 112:/...../.....	☐ 0,38g (380mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,39g (390mg)
Ημέρα 113:/...../.....	☐ 0,38g (380mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,39g (390mg)
Ημέρα 114:/...../.....	☐ 0,38g (380mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,39g (390mg)
Ημέρα 115:/...../.....	☐ 0,39g (390mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,4g (400mg)
Ημέρα 116:/...../.....	☐ 0,39g (390mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,4g (400mg)
Ημέρα 117:/...../.....	☐ 0,39g (390mg)	☐ 0,01g (10mg)		0,4g (400mg)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΟΣΕΩΝ

Καταγράψτε σημειώσεις για τις δόσεις που λαμβάνετε ανά ημέρα π.χ. πόσα g ή mg λάβατε ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, ώρα χορήγησης κ.λ.π. **Με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να ανατρέχετε στις σημειώσεις σας προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν λάθη παράλειψης δόσης, υποδοσολογίας ή υπερδοσολογίας.**

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Για πληροφορίες σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες, ανατρέξτε στην παράγραφο 4 του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης του προϊόντος. Μπορείτε να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς, απευθείας, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων με την υποβολή της Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπους:

• Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ <https://www.eof.gr/kitrini-karta/> ή απευθείας στο <http://www.kitrinikarta.gr>

• Σάρωση, μέσω του έξυπνου κινητού σας, του παρακάτω κωδικού QR, για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα <http://www.eof.gr>, για τη συμπλήρωση της «ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ».



• Έντυπη μορφή αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός) τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2040337.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες στους Υπευθύνους Φαρμακοεπαγρύπνησης:

Τηλ: 698 1648197 (Τοπικός Υπεύθυνος Φαρμακοεπαγρύπνησης),
697 9760267 (Υπεύθυνος Φαρμακοεπαγρύπνησης για την Ευρώπη)
Email: safety@leanpharmaservices.com

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.