

Κάρτα ενημέρωσης ασθενούς



- ☐ **OBERGAN 10 mg** (επιλέξτε το τετραγωνίδιο για να επιλέξετε τη συνταγογραφημένη δόση)
- ☐ **OBERGAN 15 mg** (επιλέξτε το τετραγωνίδιο για να επιλέξετε τη συνταγογραφημένη δόση)
- ☐ **OBERGAN 20 mg** (επιλέξτε το τετραγωνίδιο για να επιλέξετε τη συνταγογραφημένη δόση)

- ♦ **Κρατήστε αυτή την κάρτα μαζί σας κάθε στιγμή**
- ♦ **Παρουσιάστε αυτή την κάρτα σε κάθε ιατρό ή οδοντίατρο πριν από κάθε θεραπεία**

Είμαι υπό αντιπηκτική θεραπεία με OBERGAN (ριβαροξαμπάνη)

Όνομα:

Διεύθυνση:

Ημερομηνία γέννησης:

Βάρος:

Άλλα φάρμακα / παθήσεις:

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, παρακαλείστε να ενημερώσετε:

Όνομα ιατρού:

Τηλέφωνο ιατρού:

Σφραγίδα ιατρού:

Παρακαλείστε να ενημερώσετε επίσης:

Όνομα:

Τηλέφωνο:

Σχέση με το συγκεκριμένο πρόσωπο:

Πληροφορίες για επαγγελματίες υγείας:

- ♦ Οι τιμές INR δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επειδή δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη της αντιπηκτικής δράσης του OBERGAN.

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για το OBERGAN.

- ♦ Το OBERGAN αραιώνει το αίμα, γεγονός το οποίο σας προφυλάσσει από το να εμφανίσετε επικίνδυνους θρόμβους στο αίμα.
- ♦ Το OBERGAN θα πρέπει να λαμβάνεται ακριβώς όπως σας το έχει συνταγογραφήσει ο ιατρός σας. Για να διασφαλίσετε την προστασία από θρόμβους, **μην παραλείψετε καμία δόση.**
- ♦ Δε θα πρέπει να σταματήσετε τη λήψη του OBERGAN πριν ενημερώσετε τον ιατρό σας, καθώς ο κίνδυνος θρόμβων μπορεί να αυξηθεί.
- ♦ Μιλήστε στον ιατρό σας σχετικά με άλλα φάρμακα που λαμβάνετε αυτή την περίοδο, που έχετε λάβει πρόσφατα ή που πρόκειται να λάβετε, πριν ξεκινήσετε το OBERGAN.

♦ Ενημερώστε τον επαγγελματία υγείας ότι λαμβάνετε το OBERGAN πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση ή επεμβατική διαδικασία.

Πότε θα πρέπει να συμβουλευτώ τον ιατρό μου;

Όταν λαμβάνετε σκευάσματα που αραιώνουν το αίμα όπως είναι το OBERGAN είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειές τους. Η αιμορραγία είναι η πιο συνηθισμένη ανεπιθύμητη ενέργεια. Μην ξεκινήσετε τη λήψη του OBERGAN εάν γνωρίζετε ότι βρίσκεστε σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, χωρίς να το έχετε αρχικά συζητήσει με τον ιατρό σας.

Ενημερώστε τον ιατρό σας αμέσως εάν έχετε κάποιο από τα σημεία ή συμπτώματα όπως είναι τα παρακάτω:

- ♦ πόνος
- ♦ οίδημα (πρήξιμο κυρίως των κάτω άκρων) ή δυσφορία
- ♦ πονοκέφαλο, ζάλη ή αδυναμία
- ♦ ασυνήθιστους μώλωπες, ρινορραγίες, ουλορραγίες, αιμορραγία από κοψίματα που αργεί να σταματήσει
- ♦ έμμηνο ρύση ή κοιλιακή αιμορραγία που είναι βαρύτερη από το κανονικό
- ♦ αίμα στα ούρα που μπορεί να είναι ροζ ή καφέ,
- ♦ κόπρανα κόκκινα ή μαύρα
- ♦ αποβολή αίματος με το βήχα, ή έμετος με αίμα ή υλικό που μοιάζει με κόκκους καφέ

Πώς λαμβάνεται το OBERGAN

- ♦ Για να διασφαλίσετε τη μέγιστη προστασία, το OBERGAN
 - 10 mg μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς φαγητό
 - 15 mg πρέπει να λαμβάνεται με φαγητό
 - 20 mg πρέπει να λαμβάνεται με φαγητό