

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Οδηγός Εφαρμογής του QUTENZA® (καψαϊκίνη) για τους Επαγγελματίες Υγείας

Έκδοση 5.1 Μάρτιος 2021





Μέτρα ελαχιστοποίησης κινδύνου σχετικά με το επίθεμα Qutenza (καψαϊκίνη) 179 mg για τους Επαγγελματίες Υγείας

Οι Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) θα πρέπει να ανατρέχουν σε αυτόν τον Οδηγό πριν εφαρμόσουν το Qutenza. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Qutenza, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ).

ΜΗΝ συνταγογραφήσετε το Qutenza εάν ο ασθενής σας έχει υπερευαισθησία στη δραστική ουσία (καψαϊκίνη) ή σε κάποιο από τα έκδοχα (παράγραφος 6.1 της ΠΧΠ).

Το Qutenza εφαρμόζεται μόνο σε στεγνό, ανέπαφο (μη τραυματισμένο) δέρμα και όχι στο πρόσωπο, πάνω από τη γραμμή του τριχωτού της κεφαλής ή κοντά σε βλεννογόνους υμένες.

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα πριν χρησιμοποιήσετε το Qutenza:

Έχει ο ασθενής σας υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο;

- Για τους ασθενείς με ασταθή ή μη επαρκώς ελεγχόμενη υπέρταση ή ιστορικό καρδιαγγειακών νοσημάτων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβάντων λόγω του πιθανού στρες της διαδικασίας πριν την έναρξη της θεραπείας με Qutenza.
- Παρακολουθήστε την αρτηριακή πίεση του ασθενούς σας, πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Qutenza. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε διαβητικούς ασθενείς με ή χωρίς συνοδά νοσήματα στεφανιαίας νόσου, υπέρτασης και καρδιαγγειακής αυτόνομης νευροπάθειας.

Πάσχει ο ασθενής σας από σακχαρώδη διαβήτη;

- Διαβητικοί ασθενείς με απομακρυσμένη αισθητική νευροπάθεια ή και αγγειακή ανεπάρκεια είναι πιθανό να διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο δερματικών βλαβών στο σημείο εφαρμογής.
- Σε ασθενείς με επώδυνη περιφερική διαβητική νευροπάθεια, θα πρέπει να διενεργείται προσεκτική οπτική εξέταση των ποδιών πριν από την εφαρμογή του Qutenza και σε επακόλουθες κλινικές επισκέψεις, για την ανίχνευση δερματικών βλαβών που σχετίζονται με την υποκείμενη νευροπάθεια και την αγγειακή ανεπάρκεια.

Έχει ο ασθενής σας ανέπαφο δέρμα στην περιοχή εφαρμογής;

- Εξετάστε το δέρμα του ασθενούς σας πριν από κάθε εφαρμογή του επιθέματος Qutenza για σημάδια ραγισμένου δέρματος ή έλκους.

Έχει ο ασθενής σας προϋπάρχουσα ή αναπτυχθείσα κατά τη διάρκεια της θεραπείας μειωμένη αισθητηριακή λειτουργία;

- Η χρήση του Qutenza πρέπει να γίνεται με προσοχή σε ασθενείς με προϋπάρχουσες αλλαγές στην αισθητηριακή λειτουργία και θα πρέπει να εξετάσετε τον ασθενή σας για σημεία επιδείνωσης της αισθητηριακής λειτουργία πριν τη συνέχιση της θεραπείας με Qutenza.

Εσείς ή ο ασθενής σας αντιμετωπίζετε επιδεινούμενο ή μη επιλυόμενο αναπνευστικό ερεθισμό;

- Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις επιδεινούμενου ή μη επιλυόμενου αναπνευστικού ερεθισμού λόγω τυχαίας έκθεσης στο Qutenza, κυρίως σε επαγγελματίες υγείας που εφαρμόζουν το προϊόν. Σε περίπτωση εμφάνισης τέτοιων συμπτωμάτων, το επηρεαζόμενο άτομο θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά την επανέκθεση του στο Qutenza.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ για τους Επιστήμονες Υγείας:

- Εφαρμόστε το Qutenza σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο.
- Να φοράτε πάντα γάντια νιτριλίου (όχι λάτεξ) κατά τον χειρισμό του Qutenza. Επιπλέον, συστήνεται η χρήση μάσκας και προστατευτικών γυαλιών.
- Αποφύγετε την άμεση επαφή με το επίθεμα Qutenza, τη χρησιμοποιημένη γάζα ή τη χρησιμοποιημένη γέλη καθαρισμού και αποφύγετε να αγγίζετε τα μάτια, το στόμα ή άλλες ευαίσθητες περιοχές κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- Μην κρατάτε τα επιθέματα Qutenza κοντά στα μάτια και στους βλεννογόνους υμένες.
- Μην εφαρμόζετε το Qutenza σε τραυματισμένο δέρμα.
- Μην εφαρμόζετε το Qutenza στις ακόλουθες περιοχές: στο πρόσωπο, πάνω από τη γραμμή του τριχωτού της κεφαλής ή κοντά στα μάτια και στους βλεννογόνους υμένες.
- Απορρίψτε όλα τα επιθέματα Qutenza και τα συναφή υλικά κατάλληλα, μέσα σε σφραγισμένη σακούλα ιατρικών αποβλήτων από πολυαιθυλένιο.
- Η γέλη καθαρισμού του Qutenza περιέχει βουτυλοϋδροξυανισόλη, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει τοπικές δερματικές αντιδράσεις (π.χ. δερματίτιδα εξ επαφής) ή ερεθισμό των οφθαλμών και των βλεννογόνων.



1. Οι συνθήκες της θεραπείας:

- Ένας καλά αεριζόμενος χώρος θεραπείας με διαθέσιμο νερό.
- Μπορείτε να προσφέρετε στον ασθενή σας ένα μέσο απασχόλησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής, όπως για παράδειγμα κάποιο υλικό ανάγνωσης, ώστε να αποσπάται η προσοχή του.



2. Ενημέρωση του ασθενούς:

- **Πριν** την έναρξη της θεραπείας, εξηγήστε στον ασθενή τη διαδικασία εφαρμογής.
- Ενημερώστε τον ασθενή ότι ενδέχεται να εμφανιστούν **αντιδράσεις στο σημείο εφαρμογής**, όπως **πόνος ή αίσθημα καύσου, ερύθημα, κνησμός και οίδημα** και συμβουλευτείτε τον να ενημερώσει το παρευρισκόμενο προσωπικό σε περίπτωση εμφάνισης οποιασδήποτε ανεπιθύμητης αντίδρασης.
- Εάν ο ασθενής μείνει μόνος του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής, ενημερώστε τον για το πως να επικοινωνήσει άμεσα με κάποιον.

Παρακαλούμε ενημερώστε επίσης τους ασθενείς σας πριν τη θεραπεία με Qutenza σχετικά με:

- τον κίνδυνο μείωσης της αισθητηριακής λειτουργίας, η οποία είναι γενικά ήπια και προσωρινή μετά τη θεραπεία με Qutenza, δηλαδή της ικανότητας ανίχνευσης θερμότητας και οξέος πόνου.
- σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν σοβαροί τραυματισμοί του δέρματος, όπως εγκαύματα, μετά τη θεραπεία με Qutenza.



3. Εντοπισμός:

- Η υπό θεραπεία περιοχή θα πρέπει να προσδιοριστεί με τον εντοπισμό περιοχών **αλλοδυνίας, μέσω δυναμικών ερεθισμάτων ή ερεθισμάτων νυγμού**, καθώς και τυχόν άλλων επώδυνων περιοχών που εκτείνονται **πέρα** από την περιοχή της αλλοδυνίας.
- Μόλις εντοπίσετε τις περιοχές αυτές, σημειώστε την επώδυνη περιοχή στο δέρμα χρησιμοποιώντας **κατάλληλο μαρκαδόρο για χρήση στο δέρμα**, το μελάνι του οποίου δεν θα ξεθωριάσει κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

- Αποτυπώστε την υπό θεραπεία περιοχή σε μια διαφάνεια ή απευθείας στο επίθεμα Qutenza. Χρησιμοποιήστε ανατομικά σημεία για να διασφαλίσετε ότι το επίθεμα εφαρμόζεται στη σωστή θέση.



4. Προετοιμασία του ασθενούς:

- Αν κριθεί απαραίτητη η αφαίρεση τριχών από την υπό θεραπεία περιοχή, αυτές θα πρέπει να κόβονται και όχι να ξυρίζονται.
- Πριν από την εφαρμογή του Qutenza, μπορεί να εφαρμοστεί ένα τοπικό αναισθητικό στην υπό θεραπεία περιοχή ή να χορηγείται στον ασθενή από του στόματος αναλγητικό, για τη μείωση της πιθανής δυσφορίας που σχετίζεται με τη θεραπεία.
- Εάν χρησιμοποιηθεί τοπικό αναισθητικό, θα πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την εφαρμογή του Qutenza.
- Πριν από την εφαρμογή του επιθέματος Qutenza, το δέρμα θα πρέπει πάντα να πλένεται απαλά και να στεγνώνεται καλά.

5. Εφαρμογή:

- Θα πρέπει να φοράτε πάντα γάντια νιτριλίου κατά τον χειρισμό του Qutenza και τον καθαρισμό των υπό θεραπεία περιοχών. Μην φοράτε γάντια από λάτεξ, καθώς δεν παρέχουν επαρκή προστασία.
- Συνιστάται η χρήση μάσκας και προστατευτικών γυαλιών ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενος ερεθισμός των οφθαλμών και της αναπνευστικής οδού, ιδιαίτερα κατά την εφαρμογή και αφαίρεση του επιθέματος.
- Το Qutenza είναι ένα διαφανές επίθεμα μίας χρήσης, το οποίο μπορεί να κοπεί ώστε να προσαρμοστεί στο μέγεθος και το σχήμα της υπό θεραπείας περιοχής.
- Κόψτε το Qutenza ώστε να ταιριάζει με το μέγεθος και το σχήμα της υπό θεραπείας περιοχής **πριν αφαιρέσετε την προστατευτική ταινία**. Μην αφαιρέσετε την προστατευτική ταινία **μέχρι λίγο πριν από την εφαρμογή**.

- Η προστατευτική ταινία φέρει διαγώνια, σημείο κοπής, για να διευκολύνεται η αφαίρεσή της. Τραβήξτε και αναδιπλώστε την άκρη της προστατευτικής ταινίας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την αυτοκόλλητη επιφάνεια του επιθέματος Qutenza στην υπό θεραπεία περιοχή.
- Κρατήστε σταθερά το επίθεμα και στη συνέχεια αρχίστε να αφαιρείτε **αργά και προσεκτικά** την προστατευτική ταινία, **εφαρμόζοντας παράλληλα** το επίθεμα στο δέρμα με το άλλο χέρι.
- Αφήστε το επίθεμα να παραμείνει στη θέση του για **30 λεπτά** για τα πόδια ή για **60 λεπτά** για οποιαδήποτε άλλη περιοχή.



- Εάν η καψαϊκίνη έλθει σε επαφή με τα μάτια ή τους βλεννογόνους υμένες ξεπλύνετε με κρύο νερό. Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός των αεραγωγών, των οφθαλμών ή των βλεννογόνων, ο ασθενής θα πρέπει να απομακρυνθεί από τον χώρο που εφαρμόζεται η θεραπεία με Qutenza. Σε περίπτωση εμφάνισης δύσπνοιας, παρέχετε την κατάλληλη ιατρική φροντίδα.
- Σε ασθενείς που αναφέρουν έντονο πόνο σχετιζόμενο με τη θεραπεία, το επίθεμα Qutenza θα πρέπει να αφαιρεθεί και το δέρμα να εξεταστεί για χημικό έγκαυμα.

Συμβουλές για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του επιθέματος

- Για να είναι αποτελεσματικό το Qutenza, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι το επίθεμα **εφάπτεται πλήρως** με το δέρμα και ότι δεν υπάρχουν **φυσαλίδες αέρα ή υγρασία**.
- Η **άσκηση πίεσης** στο επίθεμα κατά την εφαρμογή, μέσω **γάζας** ή **επιδέσμου**, ώστε να **εφαρμοστεί καλά** στην υπό θεραπεία περιοχή, η χρήση **σφιχτής κάλτσας** εκ μέρους του ασθενούς, η χρήση **βαριδίων** ή **σάκων με άμμο** ή η τοποθέτηση του ασθενούς ώστε να ξαπλώσει στην περιοχή θεραπείας, μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη εφαρμογή του επιθέματος.

- Άλλες τεχνικές για τη βελτίωση τα εφαρμογής του επιθέματος περιλαμβάνουν **την κοπή του επιθέματος σε μικρότερα τμήματα**, ή τη δημιουργία εγχοπών στο επίθεμα, **τέντωμα του δέρματος** πριν από την εφαρμογή του επιθέματος, **θέρμανση του δέρματος** εάν είναι απαραίτητο, ειδικά αν το επίθεμα πρόκειται να εφαρμοστεί σε **κρύα πόδια**.



6. Αντιμετώπιση της δυσφορίας που σχετίζεται με τη θεραπεία:

- Ο τοπικός δροσισμός είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης, της οποίας σχετιζόμενης με τη θεραπεία δυσφορίας και μπορεί να χρησιμοποιείται παράλληλα με τα από του στόματος αναλγητικά εάν είναι απαραίτητο, για την αντιμετώπιση του οξέος πόνου κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία.
- Η χρήση υγρής κομπρέσας, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Qutenza θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί η υγρασία μπορεί να επηρεάσει την εφαρμογή του επιθέματος.
- Χρησιμοποιείτε ψυχρά (όχι παγωμένα) επιθέματα στην υπό θεραπεία περιοχή μετά την εφαρμογή του Qutenza. Τυλίξτε τα ψυχρά επιθέματα σε άλλο υλικό για να αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα.
- Παρέχετε στους ασθενείς ψυχρά επιθέματα για τη διαχείριση του πόνου στο σπίτι.
- Συμβουλευστε τους ασθενείς, εφόσον ενδείκνυται, για τη δυνατότητα λήψης μη συνταγογραφούμενων αναλγητικών, αν ο δροσισμός δεν ανακουφίζει αρκετά από τον πόνο.

7. Αφαίρεση:

- Φορέστε γάντια νιτριλίου, μάσκα και προστατευτικά γυαλιά πριν από την αφαίρεση του επιθέματος.
- Αφαιρέστε με αργές και απαλές κινήσεις το επίθεμα Qutenza αναδιπλώνοντάς το προς τα μέσα, **για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μετατροπής της καψαϊκίνης σε αερόλυμα.**
- Απορρίψτε όλα τα υλικά σε **σφραγισμένη σακούλα ιατρικών αποβλήτων από πολυαιθυλένιο.**



8. Καθαρισμός:

- Εφαρμόστε **επαρκή** ποσότητα γέλης καθαρισμού στην υπό θεραπεία περιοχή και αφήστε τη για τουλάχιστον **1 λεπτό.**
- Αφαιρέστε τη γέλη καθαρισμού με **στεγνή γάζα** ξεκινώντας από το εξωτερικό όριο της περιοχής θεραπείας προς το κέντρο και στη συνέχεια πλύνετε απαλά την περιοχή με σαπούνι και νερό.
- **Μην** αφήσετε το νερό που περιέχει καψαϊκίνη να έρθει σε επαφή με **το υπόλοιπο δέρμα.**



9. Συμβουλές:

- Η καψαϊκίνη, μπορεί να εξακολουθεί να **διαρρέει** από το δέρμα, μετά τον καθαρισμό. Επομένως, θα πρέπει να συμβουλευέστε τον ασθενή **να μην αγγίζει την περιοχή στην οποία εφαρμόστηκε το επίθεμα κατά τις επόμενες 1-2**

ημέρες. Συμβουλευστε τους ασθενείς, που η θεραπεία εφαρμόστηκε στην περιοχή των χεριών, να **φορούν γάντια**, για 1-2 ημέρες μετά τη θεραπεία.

- Ενημερώστε τον ασθενή ότι **η υπό θεραπεία περιοχή μπορεί να είναι ευαίσθητη** (στη ζέστη, στο ντους/μπάνιο με ζεστό νερό, στο άμεσο ηλιακό φως, στην έντονη άσκηση, κλπ.) για μερικές ημέρες.
- Ενημερώστε τον ασθενή ότι το αίσθημα καύσου **μπορεί να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας**, αλλά ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει **μεθόδους δροσισμού ή από του στόματος αναλγητικά** για να αντιμετωπίσει την όποια δυσφορία, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παράγραφο 6.
- Εάν είναι δυνατό, παρέχετε στους ασθενείς το **φύλλο ενημέρωσης που περιλαμβάνεται σε αυτό τον Οδηγό** για να το πάρουν στο σπίτι.



10. Παρακολούθηση ασθενούς:

- Όλοι οι **ασθενείς** θα πρέπει να παρακολουθούνται σε **τακτική βάση**.
- Θα πρέπει να παρέχεται στους ασθενείς **τηλέφωνο επικοινωνίας** σε περίπτωση που χρειαστούν οποιαδήποτε βοήθεια.



Ενημερωτικό φυλλάδιο για τον ασθενή

Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο μπορεί να παρασχεθεί στον ασθενή για μελλοντική αναφορά.

- Το Qutenza πρέπει να εφαρμόζεται από Επαγγελματία Υγείας . Μην εφαρμόζετε το Qutenza μόνοι σας.
- Μην αγγίζετε ή ξύνετε την περιοχή θεραπείας και μην αφήνετε κανέναν να αγγίζει την περιοχή θεραπείας.
- Είναι πιθανό να παρατηρήσετε μειωμένη αίσθηση σε θερμό ή οξύ ερέθισμα στο σημείο όπου εφαρμόστηκε το Qutenza. Αυτό είναι συνήθως παροδικό και η αίσθηση θα επανέλθει σε φυσιολογική κατάσταση εντός λίγων ημερών μετά από τη θεραπεία.
- Τοπικές παρενέργειες στην περιοχή θεραπείας όπως η ερυθρότητα, η φαγούρα, το αίσθημα καψίματος ή το οίδημα είναι συνήθεις και θα παρέλθουν κατά τις επόμενες λίγες ημέρες.
- Το αίσθημα καύσου μπορεί να αυξηθεί και πάλι κατά τη διάρκεια της νύχτας αν η περιοχή θεραπείας ζεσταθεί.
- Χρησιμοποιήστε μεθόδους τοπικού δροσισμού ή μη συνταγογραφούμενα αναλγητικά για να αντιμετωπίσετε την όποια δυσφορία.
- Αποφύγετε για λίγες ημέρες μετά από τη θεραπεία το ζεστό μπάνιο ή ντους ή την έντονη άσκηση.
- Μην εφαρμόζετε θερμότητα τοπικά στην περιοχή θεραπείας (π.χ. θερμές γάζες ή ζεστό νερό μέσα σε σακούλες ή μπουκάλια).
- Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις σοβαρών δερματικών εγκαυμάτων σε περιοχές όπου εφαρμόστηκε το Qutenza. Αν ο πόνος επιδεινωθεί σημαντικά, ή παρατηρήσετε οίδημα, ξεφλούδισμα ή φυσαλίδες στο δέρμα, θα πρέπει να αναζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια.
- Μπορείτε να παραδώσετε αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο στον γιατρό πρωτοβάθμιας περίθαλψης για την πληροφόρησή του.

Πρόσκληση για αναφορά εικαζόμενων/πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου

Παρακαλείσθε να αναφέρετε οποιοσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται στους ασθενείς σας οι οποίοι λαμβάνουν Qutenza. Κατά την αναφορά, παρακαλείσθε να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, οποιαδήποτε συγχωρήγηση άλλου φαρμάκου, καθώς και τις ημερομηνίες λήψης των φαρμάκων και εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών. Υπενθυμίζεται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τη χρήση του Qutenza μπορούν να αναφέρονται σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αυθόρμητων αναφορών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, με την υποβολή της Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπους:

1. Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ <http://www.eof.gr/> ή απευθείας <http://www.kitrinikarta.gr>
2. Έντυπη μορφή αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, 15562) τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2040337
3. Σάρωση, μέσω του «έξυπνου» κινητού σας, του παρακάτω κωδικού QR, για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα <http://www.eof.gr>, για τη συμπλήρωση της «ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ».



Εναλλακτικά οποιοσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες που παρουσιάζονται στους ασθενείς σας οι οποίοι λαμβάνουν Qutenza μπορούν να αναφέρονται στο Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης της BIANEX A.E. που λειτουργεί ως Τοπικός Υπεύθυνος Φαρμακοεπαγρύπνησης:

Τηλ: 210-8009111

Email: pvvnx@vianex.gr



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ GRUNENTHAL GmbH ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. Οδός Βαρυμπόμπη 8, 14671, Νέα Ερυθραία, Κηφισιά, Αθήνα Ελλάδα

Μπορείτε να βρείτε την ΠΧΠ και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ): <https://services.eof.gr/human-search/home.xhtml> ή με σάρωση του παρακάτω κωδικού QR:



Όλα τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία της GRUNENTHAL GmbH