

«Outer side»

Σελίδα 1

Κίνδυνος κακοηθειών

Το RINVOQ® μπορεί δυνητικά να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου, ιδιαίτερα καρκίνου του δέρματος.

Ενημερώστε το γιατρό σας εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στην εμφάνιση κάποιας περιοχής στο δέρμα σας ή παρατηρήσετε οποιαδήποτε νέα ανάπτυξη στο δέρμα σας.

Κίνδυνος να τρυπήσει το έντερο

Το RINVOQ® μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο να τρυπήσει το έντερο σας, ειδικά εάν έχετε νόσο του Crohn. Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας εάν έχετε ανεξήγητο ή απροσδόκητο πόνο στο στομάχι.

Σελίδα 2

Δείξτε αυτήν την κάρτα σε οποιονδήποτε επαγγελματία υγείας εμπλέκεται στην ιατρική σας περίθαλψη – όπως για παράδειγμα, τον οδοντίατρό σας ή έναν ιατρό επειγόντων περιστατικών. Να έχετε την κάρτα πάντα μαζί σας.

Μπορείτε να βοηθήσετε στην παρακολούθηση της ασφάλειας του RINVOQ® αναφέροντας τις ανεπιθύμητες ενέργειες που σας παρουσιάζονται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), με τη χρήση της κίτρινης κάρτας, διαθέσιμης στον δικτυακό τόπο (<http://www.eof.gr>) του ΕΟΦ, Μεσογείων 284, GR15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040337. Μπορείτε επίσης να σαρώσετε μέσω του «έξυπνου» κινητού σας τον παρακάτω κωδικό QR, για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα <http://www.eof.gr>, για τη συμπλήρωση της «ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ».



Είναι σημαντικό να καταγραφεί τόσο η εμπορική ονομασία όσο και ο αριθμός παρτίδας του προϊόντος που λαμβάνετε.

Σελίδα 3

Το όνομά σας:

Το όνομα του γιατρού που συνταγογράφησε το RINVOQ®:

Ο αριθμός τηλεφώνου του γιατρού σας:

Ημερομηνία που ξεκινήσατε το RINVOQ®:



Κάρτα Ασθενούς

Να έχετε την κάρτα συνεχώς μαζί σας

Πληροφορίες Ασφάλειας του RINVOQ® (upadacitinib) για ασθενείς

- Αυτή η κάρτα περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια που θα πρέπει να γνωρίζετε – πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το RINVOQ®.
- Διαβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (ΦΟΧ) για περισσότερες πληροφορίες.

«Inner side»

Σελίδα 1

Κίνδυνος λοιμώξεων

Η θεραπεία με RINVOQ® μπορεί να επιδεινώσει μια υπάρχουσα λοίμωξη ή να αυξήσει την πιθανότητα ανάπτυξης νέας λοίμωξης – για παράδειγμα φυματίωσης (TB), έρπητα ζωστήρα ή ιογενούς ηπατίτιδας.

Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας εάν παρατηρήσετε σημεία λοίμωξης, όπως:

- Πυρετός, εφίδρωση, ρίγη, απώλεια βάρους, ή επίμονος βήχας – αυτά μπορεί να είναι σημεία φυματίωσης.
- Επώδυνο δερματικό εξάνθημα με φουσκάλες - αυτό μπορεί να αποτελεί σημείο έρπητα ζωστήρα
- Αίσθημα κόπωσης ή δυσκολία στην αναπνοή – αυτό μπορεί να αποτελεί σημείο πνευμονίας

Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν:

- έχετε διαγνωστεί πρόσφατα με φυματίωση ή έχετε νοσήσει ποτέ από φυματίωση.
- έχετε έρθει πρόσφατα σε στενή επαφή με κάποιον που έχει φυματίωση.

Σελίδα 2

Εμβόλια για την πρόληψη λοιμώξεων

Εμβόλια ζώντων μικροοργανισμών (για παράδειγμα το εμβόλιο της γρίπης με ρινικό εκνέφωμα, ανεμοβλογιάς, ιλαράς/παρωτίτιδας/ερυθράς) δεν πρέπει να χορηγούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με RINVOQ®, ή λίγο πριν την έναρξη της θεραπείας.

Πριν τη χορήγηση οποιωνδήποτε εμβολίων, μιλήστε με το γιατρό σας – αυτός θα γνωρίζει ποια εμβόλια **δεν** πρέπει να σας χορηγηθούν πριν ή κατά τη διάρκεια της θεραπείας με RINVOQ®.

Σελίδα 3

Κίνδυνος καρδιακής νόσου

Η θεραπεία με RINVOQ® συσχετίστηκε με αυξήσεις στη χοληστερόλη (λιπίδιο στο αίμα). Ο γιατρός σας θα ελέγξει τα επίπεδα χοληστερόλης σας ενώ παίρνετε το RINVOQ®.

Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας εάν παρατηρήσετε συμπτώματα όπως πόνο στο στήθος ή σφίξιμο καθώς αυτά μπορεί να είναι συμπτώματα καρδιακής νόσου.

Σελίδα 4

Αντισύλληψη, κύηση και θηλασμός

Το RINVOQ® δεν πρέπει να λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

- Χρησιμοποιείτε αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια λήψης RINVOQ® – και για 4 εβδομάδες μετά την τελευταία σας δόση. Συζητήστε με το γιατρό σας σχετικά με το ποια μέθοδος αντισύλληψης είναι αποτελεσματική.
- Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας εάν πρόκειται να μείνετε έγκυος, ή εάν είστε ήδη έγκυος.
- Μη θηλάζετε ενόσω χρησιμοποιείτε το RINVOQ®.

Κίνδυνος θρόμβων στις φλέβες ή στους πνεύμονες

Έχουν παρατηρηθεί θρόμβοι του αίματος στις φλέβες ή στους πνεύμονες με τη χορήγηση RINVOQ®. Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας εάν εμφανίσετε σημεία θρόμβων στις φλέβες ή στους πνεύμονες, όπως επώδυνο πρήξιμο στο πόδι, δυσκολία στην αναπνοή, ή πόνο στο στήθος.