



ΚΑΡΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Medochemie (logo)

Enkia 15 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (επιλέξτε το τετραγωνίδιο για να επιλέξετε τη συνταγογραφημένη δόση)

Enkia 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (επιλέξτε το τετραγωνίδιο για να επιλέξετε τη συνταγογραφημένη δόση)

- Κρατήστε αυτή την κάρτα μαζί σας κάθε στιγμή
- Παρουσιάστε αυτή την κάρτα σε κάθε ιατρό ή οδοντίατρο πριν από κάθε θεραπεία

Είμαι υπό αντιπηκτική θεραπεία με Enkia® (ριβαροξαμπάνη)

Όνομα:

Διεύθυνση:

Ημερομηνία γέννησης:

Βάρος:

Άλλα φάρμακα / καταστάσεις:

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, παρακαλείστε να ενημερώσετε:

Όνομα ιατρού:

Τηλέφωνο ιατρού:

Σφραγίδα ιατρού:

Παρακαλείστε να ενημερώσετε επίσης:

Όνομα:

Τηλέφωνο:

Σχέση:

Πληροφορίες για επαγγελματίες υγείας:

- Οι τιμές INR δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επειδή δεν αποτελούν αξιόπιστο μέτρο της αντιπηκτικής δράσης της ριβαροξαμπάνης.

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για το Enkia®;

Η ριβαροξαμπάνη αραιώνει το αίμα, γεγονός το οποίο σας προφυλάσσει από το να αποκτήσετε επικίνδυνους θρόμβους στο αίμα.

- Enkia® θα πρέπει να λαμβάνεται ακριβώς όπως σας έχει συνταγογραφήσει ο ιατρός σας. Για να διασφαλίσετε την προστασία από θρόμβους, μην παραλείψετε καμία δόση.
- Δε θα πρέπει να σταματήσετε τη λήψη του Enkia® πριν ενημερώσετε τον ιατρό σας καθώς ο κίνδυνος των θρόμβων μπορεί να αυξηθεί.
- Μιλήστε στον ιατρό σας σχετικά με άλλα φάρμακα που λαμβάνετε αυτή την περίοδο, που έχετε λάβει πρόσφατα ή που πρόκειται να λάβετε, πριν ξεκινήσετε το Enkia®.
- Ενημερώστε τον επαγγελματία υγείας ότι λαμβάνετε το Enkia® πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση ή επεμβατική διαδικασία.

Πότε θα πρέπει να συμβουλευτώ τον πάροχο ιατρικής φροντίδας;

Όταν λαμβάνετε σκευάσματα που αραιώνουν το αίμα όπως είναι η ριβαροξαμπάνη είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειές τους. Η αιμορραγία είναι η πιο συνηθισμένη ανεπιθύμητη ενέργεια. Μην ξεκινήσετε τη λήψη του Enkia® εάν γνωρίζετε ότι βρίσκεστε σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, χωρίς να το έχετε αρχικά συζητήσει με τον ιατρό σας. Ενημερώστε τον ιατρό σας αμέσως εάν έχετε κάποιο από τα σημεία ή συμπτώματα όπως είναι τα παρακάτω:

- 
- πόνος
 - οίδημα ή δυσφορία
 - πονοκέφαλο, ζάλη ή αδυναμία
 - ασυνήθιστους μώλωπες, ρινορραγίες, ουλорραγίες, αιμορραγία από κοψίματα που αργεί να σταματήσει
 - έμμηνο ρύση ή κοιλιακή αιμορραγία που είναι βαρύτερη από το κανονικό
 - αίμα στα ούρα που μπορεί να είναι ρόζ ή καφέ, κόπρανα κόκκινα ή μαύρα
 - αποβολή αίματος με το βήχα, ή έμετος με αίμα ή υλικό που μοιάζει με κόκκους καφέ

Πώς λαμβάνεται το Enkia®;

Για να διασφαλίσετε τη μέγιστη προστασία, το Enkia®

- 15 mg πρέπει να λαμβάνεται με φαγητό
- 20 mg πρέπει να λαμβάνεται με φαγητό