

Κάρτα ενημέρωσης ασθενούς



☐ Rivaroxaban/Genepharm 2,5 mg
☐ Rivaroxaban/Genepharm 15 mg

☐ Rivaroxaban/Genepharm 10 mg
☐ Rivaroxaban/Genepharm 20 mg

(επιλέξτε το τετραγωνίδιο για να επιλέξετε τη συνταγογραφημένη δόση)

- ❖ Κρατήστε αυτή την κάρτα μαζί σας κάθε στιγμή
- ❖ Παρουσιάστε αυτή την κάρτα σε κάθε ιατρό ή οδοντίατρο πριν από κάθε θεραπεία

Είμαι υπό αντιπηκτική θεραπεία με Rivaroxaban/Genepharm (ριβαροξαμπάνη)

Όνομα:

Διεύθυνση:

Ημερομηνία γέννησης:

Βάρος:

Άλλα φάρμακα / καταστάσεις:

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε:

Όνομα ιατρού:

Τηλέφωνο ιατρού:

Σφραγίδα ιατρού:

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε επίσης:

Όνομα:

Τηλέφωνο:

Σχέση:

Πληροφορίες για επαγγελματίες υγείας:

- ❖ Οι τιμές INR δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επειδή δεν αποτελούν αξιόπιστο μέτρο της αντιπηκτικής δράσης του Rivaroxaban/Genepharm.

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για το Rivaroxaban/Genepharm

- ❖ Το Rivaroxaban/Genepharm αραιώνει το αίμα, γεγονός το οποίο σας προφυλάσσει από το να αποκτήσετε επικίνδυνους θρόμβους στο αίμα.
- ❖ Το Rivaroxaban/Genepharm θα πρέπει να λαμβάνεται ακριβώς όπως σας έχει συνταγογραφήσει ο ιατρός σας. Για να διασφαλίσετε την προστασία από θρόμβους, **μην παραλείψετε καμία δόση.**
- ❖ Δε θα πρέπει να σταματήσετε τη λήψη του Rivaroxaban/Genepharm προτού ενημερώσετε τον ιατρό σας καθώς ο κίνδυνος των θρόμβων μπορεί να αυξηθεί.
- ❖ Ενημερώστε τον επαγγελματία υγείας σχετικά με άλλα φάρμακα που λαμβάνετε αυτή την περίοδο, που έχετε λάβει πρόσφατα ή που πρόκειται να λάβετε, προτού ξεκινήσετε το Rivaroxaban/Genepharm.

Ημερομηνία έγκρισης ΕΟΦ:

- ❖ Ενημερώστε τον επαγγελματία υγείας ότι λαμβάνετε το Rivaroxaban/Genepharma πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση ή επεμβατική διαδικασία.

Πότε θα πρέπει να συμβουλευτώ τον ιατρό μου?

Όταν λαμβάνετε σκευάσματα που αραιώνουν το αίμα όπως είναι το Rivaroxaban/Genepharma είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειές τους. Η αιμορραγία είναι η πιο συνηθισμένη ανεπιθύμητη ενέργεια. Μην ξεκινήσετε τη λήψη του Rivaroxaban/Genepharma εάν γνωρίζετε ότι βρίσκεστε σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, χωρίς να το έχετε αρχικά συζητήσει με τον ιατρό σας. Ενημερώστε τον ιατρό σας αμέσως εάν έχετε κάποιο από τα σημεία ή συμπτώματα όπως είναι τα παρακάτω:

- ❖ πόνο
- ❖ οίδημα ή δυσφορία
- ❖ πονοκέφαλο, ζάλη ή αδυναμία
- ❖ ασυνήθιστους μώλωπες, ρινορραγίες, ουλορραγίες, αιμορραγία από κοψίματα που αργεί να σταματήσει
- ❖ έμμηνο ρύση ή κοιλιακή αιμορραγία που είναι δριμύτερη από το κανονικό
- ❖ αίμα στα ούρα που μπορεί να είναι ροζ ή καφέ, κόπρανα κόκκινα ή μαύρα
- ❖ αποβολή αίματος με το βήχα, ή έμετος με αίμα ή υλικό που μοιάζει με κόκκους καφέ

Πώς λαμβάνεται το Rivaroxaban/Genepharma

- ❖ Για να διασφαλίσετε τη μέγιστη προστασία, το Rivaroxaban/Genepharma
 - 2,5mg μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς φαγητό
 - 10 mg μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς φαγητό
 - 15 mg πρέπει να λαμβάνεται με φαγητό
 - 20 mg πρέπει να λαμβάνεται με φαγητό