

35 mm	261.5 mm		
	87.5 mm	88 mm	86 mm
	Κάρτα ενημέρωσης Raxivanol 10 mg ☐ Raxivanol 15 mg ☐ Raxivanol 20 mg Κρατήστε αυτή την κάρτα μαζί σας κάθε στιγμή Παρουσιάστε αυτή την κάρτα σε κάθε ιατρό ή οδοντίατρο πριν από κάθε θεραπεία	Είμαι υπό αντιπηκτική θεραπεία με RAXIVANOL (ριβαροξαμπάνη) Όνομα: Διεύθυνση: Ημερομηνία γέννησης: Βάρος: Άλλα φάρμακα / καταστάσεις: Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, παρακαλείστε να ενημερώσετε: Όνομα ιατρού: Τηλέφωνο ιατρού: Σφραγίδα ιατρού: Παρακαλείστε να ενημερώσετε επίσης: Όνομα: Τηλέφωνο: Σχέση:	Πληροφορίες για επαγγελματίες υγείας: - Οι τιμές INR δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επειδή δεν αποτελούν αξιόπιστο μέτρο της αντιπηκτικής δράσης του RAXIVANOL. Τι θα πρέπει να γνωρίζω για το RAXIVANOL; - Το RAXIVANOL αραιώνει το αίμα, γεγονός το οποίο σας προφυλάσσει από το να αποκτήσετε επικίνδυνους θρόμβους στο αίμα. - Το RAXIVANOL θα πρέπει να λαμβάνεται ακριβώς όπως σας έχει συνταγογραφήσει ο ιατρός σας. Για να διασφαλίσετε την προστασία από θρόμβους, μην παραλείψετε καμία δόση. - Δε θα πρέπει να σταματήσετε τη λήψη του RAXIVANOL πριν ενημερώσετε τον ιατρό σας καθώς ο κίνδυνος των θρόμβων μπορεί να αυξηθεί.

86 mm	88 mm	87.5 mm
- Μιλήστε στον ιατρό σας σχετικά με άλλα φάρμακα που λαμβάνετε αυτή την περίοδο, που έχετε λάβει πρόσφατα ή που πρόκειται να λάβετε, πριν ξεκινήσετε το RAXIVANOL. - Ενημερώστε τον επαγγελματία υγείας ότι λαμβάνετε το RAXIVANOL πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση ή επεμβατική διαδικασία. Πότε θα πρέπει να συμβουλευτώ τον ιατρό μου; Όταν λαμβάνετε σκευάσματα που αραιώνουν το αίμα όπως είναι το RAXIVANOL είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειές τους. Η αιμορραγία είναι η πιο συνηθισμένη ανεπιθύμητη ενέργεια. Μην ξεκινήσετε τη λήψη του RAXIVANOL εάν γνωρίζετε ότι βρίσκεστε σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, χωρίς να το έχετε αρχικά συζητήσει με τον ιατρό σας.	Ενημερώστε τον ιατρό σας αμέσως εάν έχετε κάποιο από τα σημεία ή συμπτώματα όπως είναι τα παρακάτω: - πόνο - οίδημα ή δυσφορία - πονοκέφαλο, ζάλη ή αδυναμία - ασυνήθιστους μώλωπες, ρινορραγίες, ουλορραγίες, αιμορραγία από κοψίματα που αργεί να σταματήσει - έμμηνο ρύση ή κοιλιακή αιμορραγία που είναι βαρύτερη από το κανονικό - αίμα στα ούρα που μπορεί να είναι ρόζ ή καφέ, κόπρανα κόκκινα ή μαύρα - αποβολή αίματος με το βήχα, ή έμετος με αίμα ή υλικό που μοιάζει με κόκκους καφέ version RAX-PA-AN-MT-v1 12/2021	Πώς λαμβάνεται το RAXIVANOL • Για να διασφαλίσετε τη μέγιστη προστασία, το RAXIVANOL - 10 mg μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς φαγητό - 15 mg πρέπει να λαμβάνεται με φαγητό - 20 mg πρέπει να λαμβάνεται με φαγητό