



ΚΑΡΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Κάρτα Ενημέρωσης Ασθενούς

Rivaroxaban/Sandoz 10 mg (επιλέξτε το τετραγωνίδιο για να επιλέξετε τη συνταγογραφημένη δόση)

Rivaroxaban/Sandoz 15 mg (επιλέξτε το τετραγωνίδιο για να επιλέξετε τη συνταγογραφημένη δόση)

Rivaroxaban/Sandoz 20 mg (επιλέξτε το τετραγωνίδιο για να επιλέξετε τη συνταγογραφημένη δόση)

- ♦ Κρατήστε αυτή την κάρτα μαζί σας κάθε στιγμή
- ♦ Παρουσιάστε αυτή την κάρτα σε κάθε ιατρό ή οδοντίατρο πριν από τη θεραπεία

Είμαι υπό αντιπηκτική θεραπεία με Rivaroxaban/Sandoz (ριβαροξαμπάνη)

Όνομα:

Διεύθυνση:

Ημερομηνία γέννησης:

Βάρος:

Άλλα φάρμακα/καταστάσεις:

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, παρακαλείστε να ειδοποιήσετε:

Όνομα ιατρού:

Τηλέφωνο ιατρού:

Σφραγίδα ιατρού:

Παρακαλείστε να ειδοποιήσετε επίσης:

Όνομα:

Τηλέφωνο:

Σχέση:

Πληροφορίες για επαγγελματίες υγείας:

- ♦ Οι τιμές INR δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, καθώς δεν αποτελούν αξιόπιστο μέτρο της αντιπηκτικής δράσης του Rivaroxaban/Sandoz.

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για το Rivaroxaban/Sandoz;

- ♦ Το Rivaroxaban/Sandoz αραιώνει το αίμα, γεγονός που αποτρέπει την εμφάνιση επικίνδυνων θρόμβων στο αίμα.
- ♦ Το Rivaroxaban/Sandoz θα πρέπει να λαμβάνεται ακριβώς όπως σας έχει συνταγογραφήσει ο ιατρός σας. Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη προστασία από θρόμβους, **μην παραλείψετε ποτέ μια δόση.**
- ♦ Δε θα πρέπει να σταματήσετε τη λήψη του Rivaroxaban/Sandoz χωρίς να μιλήσετε πρώτα με τον ιατρό σας, καθώς μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος θρόμβων στο αίμα σας.
- ♦ Μιλήστε στον ιατρό σας σχετικά με άλλα φάρμακα που λαμβάνετε αυτή την περίοδο, έχετε λάβει πρόσφατα ή πρόκειται να λάβετε, πριν ξεκινήσετε το Rivaroxaban/Sandoz.
- ♦ Ενημερώστε τον επαγγελματία υγείας ότι λαμβάνετε το Rivaroxaban/Sandoz πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση ή επεμβατική διαδικασία.

Πότε θα πρέπει να ζητήσω συμβουλές από τον ιατρό μου;

Όταν λαμβάνετε σκευάσματα που αραιώνουν το αίμα, όπως είναι το Rivaroxaban/Sandoz, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειές τους. Η αιμορραγία είναι η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια. Μην ξεκινήσετε τη λήψη του Rivaroxaban/Sandoz εάν γνωρίζετε ότι βρίσκεστε σε κίνδυνο για αιμορραγία, χωρίς να το έχετε αρχικά συζητήσει με τον ιατρό σας. Ενημερώστε τον ιατρό σας αμέσως εάν έχετε κάποιο

από τα σημεία ή συμπτώματα όπως είναι τα παρακάτω:

- ♦ πόνος
- ♦ οίδημα ή δυσφορία
- ♦ κεφαλαλγία, ζάλη ή αδυναμία
- ♦ ασυνήθιστους μώλωπες, ρινορραγίες, ουλορραγίες, αιμορραγία από κοψίματα που αργεί να σταματήσει
- ♦ έμμηνο ρύση ή κοιλιακή αιμορραγία που είναι βαρύτερη από το κανονικό
- ♦ αίμα στα ούρα που μπορεί να είναι ρόζ ή καφέ, κόκκινα ή μαύρα κόπρανα
- ♦ αποβολή αίματος με το βήχα, ή έμετος με αίμα ή υλικό που μοιάζει με κόκκους καφέ

Πώς λαμβάνεται το Rivaroxaban/Sandoz;

- ♦ Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη προστασία, το Rivaroxaban/Sandoz
 - 10 mg μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς φαγητό
 - 15 mg πρέπει να λαμβάνεται με φαγητό
 - 20 mg πρέπει να λαμβάνεται με φαγητό