

ΚΑΡΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ



- ♦ Κρατήστε αυτή την κάρτα μαζί σας κάθε στιγμή
- ♦ Παρουσιάστε αυτή την κάρτα σε κάθε ιατρό ή οδοντίατρο πριν από κάθε θεραπεία

Είμαι υπό αντιπηκτική θεραπεία με Xareben® (ριβαροξαμπάνη)

(επιλέξτε την περιεκτικότητα που σας έχει
συνταγογραφηθεί)

- ☐ Xareben® 10 mg
☐ Xareben® 15 mg
☐ Xareben® 20 mg

Όνομα:
Διεύθυνση:
Ομάδα αίματος:
Ημερ. γέννησης: Βάρος:
Άλλα φάρμακα / καταστάσεις:

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, παρακαλείστε να ενημερώσετε:

Όνομα ιατρού:
Τηλέφωνο ιατρού:
Σφραγίδα ιατρού:

Παρακαλείστε να ενημερώσετε επίσης:

Όνομα: Τηλέφωνο:
Σχέση:

Πληροφορίες για επαγγελματίες υγείας:

♦ Οι τιμές INR δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επειδή δεν αποτελούν αξιόπιστο μέτρο της αντιπηκτικής δράσης του Xareben®.

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για το Xareben®.

- ♦ Το Xareben® αραιώνει το αίμα, γεγονός το οποίο σας προφυλάσσει από το να αποκτήσετε επικίνδυνους θρόμβους στο αίμα.
- ♦ Το Xareben® θα πρέπει να λαμβάνεται ακριβώς όπως σας έχει συνταγογραφήσει ο ιατρός σας. Για να διασφαλίσετε την προστασία από θρόμβους, **μην παραλείψετε καμία δόση.**
- ♦ Δε θα πρέπει να σταματήσετε τη λήψη του Xareben® πριν ενημερώσετε τον ιατρό σας καθώς ο κίνδυνος των θρόμβων μπορεί να αυξηθεί.
- ♦ Μιλήστε στον ιατρό σας σχετικά με άλλα φάρμακα που λαμβάνετε αυτή την περίοδο, που έχετε λάβει πρόσφατα ή που πρόκειται να λάβετε, πριν ξεκινήσετε το Xareben®.
- ♦ Ενημερώστε τους ιατρούς σας ότι λαμβάνετε το Xareben® πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση ή επεμβατική διαδικασία.

Πότε θα πρέπει να συμβουλευτώ τον ιατρό μου;

Όταν λαμβάνετε σκευάσματα που αραιώνουν το αίμα όπως είναι το Xareben® είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειές τους. Η αιμορραγία είναι η πιο συνηθισμένη ανεπιθύμητη ενέργεια. Μην ξεκινήσετε τη λήψη του Xareben® εάν γνωρίζετε ότι βρίσκεστε σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, χωρίς να το έχετε αρχικά συζητήσει με τον ιατρό σας.

Ενημερώστε τον ιατρό σας αμέσως εάν έχετε κάποιο από τα σημεία ή συμπτώματα όπως είναι τα παρακάτω:

- ♦ πόνο
- ♦ οίδημα ή δυσφορία
- ♦ πονοκέφαλο, ζάλη ή αδυναμία
- ♦ ασυνήθιστους μώλωπες, ρινορραγίες, ουλορραγίες, αιμορραγία από κοψίματα που αργεί να σταματήσει
- ♦ έμμηνο ρύση ή κοιλιακή αιμορραγία που είναι βαρύτερη από το κανονικό
- ♦ αίμα στα ούρα που μπορεί να είναι ροζ ή καφέ, κόπρανα κόκκινα ή μαύρα
- ♦ αποβολή αίματος με το βήχα, ή έμετος με αίμα ή υλικό που μοιάζει με κόκκους καφέ

Πώς λαμβάνεται το Xareben®

- ♦ Για να διασφαλίσετε τη μέγιστη προστασία το Xareben
 - 10 mg πρέπει να λαμβάνεται με ή χωρίς φαγητό
 - 15mg, 20 mg πρέπει να λαμβάνονται με φαγητό